

분류번호 222

전문 의약품

급·만성 호흡기질환 치료제
뮤코브이 시럽
(염산암브록솔)

뮤코브이는 염산 암브록솔계제로서 호흡기계 점막에 보호피막을 형성하는 Surfactant (표면 활성물질)의 분비를 촉진하고 분비물 용해작용, 점액분비 촉진작용을 가지고 있어 점액의 배출을 촉진하고 호흡을 용이하게 하므로 급·만성 이비인후, 호흡기 질환에 유효한 약물입니다.

【원료약품 및 분량】 100mL 중
염산암브록솔(BP) 300mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 80mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP) 20mg

【성 상】 무색의 체리향이 나는 시럽제

【효능·효과】
점액분비장애로 인한 급·만성 호흡기 질환 : 급·만성 기관지염, 천식성 기관지염, 부비강염, 전성비염

【용법·용량】
성 인 : 염산 암브록솔로서 치료초기에 1회 30mg(10mL), 1일 3회 경구투여하고 계속 치료시 1회 15mg(5mL), 1일 3회 투여합니다.
소 아 : - 5세 이상 : 1회 15mg(5mL), 1일 2~3회 투여합니다.
 - 2 ~ 4 세 : 1회 7.5mg(2.5mL), 1일 3회 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상 주의사항】
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 환자
2) 과당 불내성의 유전적 소인을 가진 환자(소르비톨 함유제제에 한함)
3) 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍, 글루코오스-갈락토오스 흡수불량의 유전적 소인을 가진 환자(유당 함유제제에 한함)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
1) 중증 신장에 환자
2) 임부 : 이 약은 태반장벽을 통과한다. 전임상시험 뿐만 아니라 임신 28주후의 임상 경험에서도 임신중에 악영향의 증거는 보이지 않았으나 이 약은 임신중에 투여가 권장되지 않는다.(특히, 임신 초기 3개월 이내에는 투여하지 않는다.)
3) 수유부 : 이 약은 모유로 이행하므로 수유중인 여성은 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
4) 소아 : 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 2세 미만의 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
5) 고령자 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약과 같은 점액용해제 복용과 관련하여 스티븐스-존슨 증후군, 리엘 증후군 같은 심각한 피부 손상이 매우 드물게 보고되었다. 이 약 복용중 새로운 피부/점막 손상이 나타나면 즉시 복용을 중지하고 전문가의 상담을 받아야 한다.
2) 소화기계 : 때때로 소화불량, 구역, 구토, 가슴쓰림, 구강건조를 포함하는 경미한 상부 위장관계 이상반응, 드물게 위부불쾌감, 위·복부팽만감, 위·복통, 설사, 변비, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.

3) 과민증 : 드물게 피부 발진과 같은 알러지 반응과 중증의 급성 아나필락시스양 반응(아나필락시스 속 포함)이 보고되었으며, 두드러기, 두드러기양 홍반, 맥관부종, 가려움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있다.
4) 호흡기계 : 백혈구증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다.
5) 신경계 : 때때로 혀의 감각이상, 미각 변화가 보고되었으며, 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다.
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세퓨록심, 독시사이클린 등의 항생물질과 병용투여시 기관지폐 분비물과 객담에서 항생물질의 농도를 증가시킨다.
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관한다.

【포장단위】 100, 500mL

【저장방법】 기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

【사용기한】 제조일로부터 24개월

【제 조 자】 대우약품공업(주)/부산시 사하구 신평동 579번지

【제조·의뢰자】 이연제약(주)/충북 진천군 덕산면 한천리 27-27

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 1월 2일)이후 변경된 내용은 www.reyonpharm.co.kr이나 ezdrug.kfda.go.kr에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명이나 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조

※ 고객센터상담 : 080-221-2000(수신자부담)

작성년월일 : 2009. 1. 2

理研 이연제약주식회사
본사:서울·용산구 동빙고동 39-6
공장:충북 진천군 덕산면 한천리 27-27
TEL. (02)793-5557,5374