

배 뇨 축 진 제

유니네콜 정

(염화베타네콜)

■ 특징점

1. 유니네콜정은 Choline 유사약물로서 주로 부교감신경계를 자극하므로 방광의 콜린성 수용체에 선택적으로 작용하여, 방광배뇨근의 긴장도를 증가시키며 방광 수축을 통해 배뇨를 일으킵니다.
2. 유니네콜정은 부교감신경 흥분제로서 방광에 대한 선택성이 두드러지며 무스카린성 효과는 미미합니다.
3. 유니네콜정은 무스카린성 수용체만을 선택적으로 자극하며, 니코틴성 작용이 거의 없으므로 부작용이 적습니다.
4. 배뇨, 배변, 연동운동 항진 효과를 나타내는 용량에서는 신경절 및 수의근에 거의 영향을 미치지 않습니다.

■ 원료약품의 분량 1정 중

염화베타네콜(유에스피) 25mg

■ 성 상 황색의 원형 정제.

■ 효능 · 효과

수술후, 분만후 기능성 요정체, 방광의 신경성 근이완증

■ 용법 · 용량

보통 성인 1회 10~25mg을 1일 3~4회 투여합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 일반적 주의
이 약을 투여한 후 심한 부작용이 나타났을 경우 황산아트로핀을 피해주사합니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 위장관 또는 요로의 기계적인 패쇄가 있는 환자
 - 2) 경련성 위장질환, 위궤양, 급성위장관 염증성 질환
 - 3) 복막염 환자
 - 4) 미주신경긴장항진 환자
 - 5) 천식환자
 - 6) 갑상선기능항진증 환자
 - 7) 관상동맥폐쇄 환자
 - 8) 서맥, 방실전도장애, 혈관운동 불안정성 환자
 - 9) 저혈압, 고혈압 환자
 - 10) 심근경색증 환자, 중증심질환 환자
 - 11) 간질 및 파킨슨증 환자
 - 12) 항콜린에스테라제로 치료 받는 환자
 - 13) 위장관문합술을 받은 후 치유되지 않는 환자
 - 14) 임부

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 때때로 속쓰림, 복부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 위경련, 설사가 나타날 수 있습니다.
- 2) 신경계 : 때때로 발한, 홍조, 타액분비가 나타날 수 있습니다.
- 3) 순환기계 : 특히 심계항진, 저혈압이 나타날 수 있습니다. 고혈압 환자에서 짧은 기간의 심방성세동이 나타날 수 있습니다.
- 4) 과량투여 : 심장정지로 인한 실신, 일시적인 완전심블록, 호흡곤란, 기립성 저혈압, 무의식 배변, 요의 절박 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 5) 기타 : 때때로 천식성 발작(특히 천식환자에서), 흉부긴박감, 두통, 불쾌감 등이 나타날 수 있습니다.

4. 상호작용

- 1) 퀴니딘 및 프로카인아미드는 콜린효과에 길항작용을 나타내므로 이 약을 병용투여할 경우 주의를 요합니다.
- 2) 콜린성약물 특히 콜린에스테라제 억제제와 병용할 경우 상승효과가 나타날 수 있으므로 주의합니다.
- 3) 교감신경차단제를 복용하는 환자에게 투여하면 심한 복부증상에 잇달아 급격한 혈압강하가 일어날 수 있으므로 특별히 주의합니다.

■ 포장단위 300, 500정

■ 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간 제조일로부터 36개월

■ 소비자상담실 02) 489-3611 개발부

본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시
사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

작성일자 : 2003. 5. 21



한국유니온제약(주)
UNION KOREA PHARM CO., LTD.
강원도 원주시 문막읍 반계리 5-9
TEL. (033) 731-2804