기능성 요정체

하이네콜정

(염화베타네콜)

전문의약품

분류번호 : 123

성 상

황색의 원형정제

성분 · 함량

1정 중

Bethanechol chloride(U.S.P) ····· 25mg

약리작용 및 특징

1. 콜린 유사 약물로서 부교감신경계를 자극하여 효과를 나타냅니다.
2. 콜린성 수용체에 작용하여 방광배뇨근의 긴장도 증가, 방광 수축 유발을 나타냅니다.
3. Cholinesterase에 의해서 분해되지 않으므로 acetylcholine보다 효과가 오래 지속됩니다.
4. 치료용량에서는 심박동수, 혈압, 말초순환에 대해 거의 영향을 미치지 않습니다.

효능 · 효과

수술후 · 분만후 기능성 요정체, 방광의 신경성 근이완증

용법 · 용량

보통 성인 1회 10~25밀리그람을 1일 3~4회 투여하십시오.

사용상의 주의사항

1. 일반적 주의

이 약을 투여한 후 심한 부작용이 나타났을 경우 황산아트로핀을 피하주사 하십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 위장관 또는 요로의 기계적인 패쇄가 있는 환자
2) 경련성 위장질환, 위궤양, 급성위장관 염증성 질환
3) 복막염 환자
4) 미주신경긴장항진 환자
5) 천식환자
6) 갑상선기능항진증 환자
7) 관상동맥폐쇄 환자
8) 서맥, 방실전도장애, 혈관운동 불안정성 환자
9) 저혈압, 고혈압 환자
10)심근경색증 환자, 중증심질환 환자
11) 간질 및 파킨슨증 환자
12)항콜린 에스테라제로 치료 받는 환자
13) 위장관문합술을 받은 후 치유되지 않은 환자
14)임부

3. 부작용

1) 소화기계: 때때로 속쓰림, 복부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 위경련, 설사가 나타날 수 있습니다.
2) 신경계: 때때로 발한, 홍조, 타액분비가 나타날 수 있습니다.
3) 순환기계: 특히 심계항진, 저혈압이 나타날 수 있습니다. 고혈압 환자에서 짧은 기간의 심방성세동이 나타날 수 있습니다
4) 과량투여: 심장정지로 인한 실신, 일시적인 완전심블록, 호흡곤란, 기립성 저혈압, 무의식 배변, 요의 절박 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
5) 기타: 때때로 천식성 발작(특히 천식환자에서), 흉부긴박감, 두통, 불쾌감 등이 나타날 수 있습니다.

4. 상호작용

1) 퀴니딘 및 프로카인아미드는 콜린효과에 길항작용을 나타내므로 이 약을 병용 투여할 경우 주의를 요하십시오.
2) 콜린성약물 특히 콜린에스테라제 억제제와 병용할 경우 상승효과가 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
3) 교감신경차단제를 복용하는 환자에게 투여하면 심한 복부증상에 잇달아 급격한 혈압강하가 일어날 수 있으므로 특별히 유의 하십시오.

포장단위

300정

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 "소비자피해보상규정"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

P0304-01

일양약품주식회사
경기도 용인시 기흥읍 하갈리 182-4
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 031-270-6158 홈페이지 www.ilyang.co.kr