

생약성분의 혈액순환 개선제

포리웨이 정 80mg(은행엽엑스)

Ginkgo biloba leaf extract

우수의약품제조관리기준

KGMP적격지정업체

일반의약품

분류번호 : 219

혈액은 온몸을 순환하며 각 세포에 필요한 산소·영양소·호르몬 등을 신체 각 부위로 운반하고, 각 세포에서 생성된 노폐물을 제거합니다. 그러므로 혈액순환이 잘되지 않으면, 신체 각 부위는 제기능을 발휘하지 못할 뿐만 아니라 각종 장애와 질환이 발생합니다.

포리웨이정은 다음과 같은 작용으로 혈액순환을 원활하게 합니다.

1. 혈관의 손상방지 및 탄력유지

포리웨이정은 혈관세포를 파괴하여 혈관벽을 손상시키는 유리기(free radical)를 제거하거나 생성을 억제하여 혈관을 보호하고 탄력성을 유지합니다.

2. 혈액의 점도저하

포리웨이정은 적혈구막을 안정화하여 적혈구의 파괴를 막고, 혈소판 및 적혈구 응집을 억제하여 혈전생성을 방지함으로써 혈액점도를 저하시켜 혈액순환이 원활하도록 합니다.

3. 말초혈관 확장작용

포리웨이정은 혈관확장인자(EDRF)를 유리시켜 말초혈관을 확장시킴으로써 혈액순환을 원활하게 합니다.

4. 뇌혈액 순환개선

포리웨이정은 뇌혈액 순환을 개선하여 뇌에 충분한 혈액을 공급함으로써 두통, 어지러움, 기억력 감퇴, 이명 등 뇌순환 장애로 인한 여러 증상을 예방·치료합니다.

■ 성분·함량: 1정중

은행엽엑스(KPC)80mg(총 키크폴라본배당체로서 19.2mg)

■ 성상

녹색의 타원형 필름코팅정

■ 효능·효과

·주요 효능

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 귀울림
- 3) 귀울림, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

■ 용법·용량

·성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 귀울림 : 은행엽엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여 합니다.
- 2) 기질성 뇌기능 장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 경구투여합니다.

·연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
이 약에 과민증 환자
2. 부작용
드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.
3. 일반적 주의
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.
4. 임부에 대한 투여
동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.
5. 소아에 대한 투여
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.
6. 저장상의 주의사항
직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관합니다.

■ 저장방법


기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간

제조일로부터 36개월

■ 포장단위

자사포장단위



생명과학 연구중심 제약기업

(주)이텍스제약

경기도 안산시 단원구 초지동 649-1
www.etexpharm.com

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 02)2109-4260이나 www.etexpharm.com 에서 확인할 수 있습니다.

개정년월일 2006년 7월 18일