

■ 원료약품 및 그 분량:1정중
플로로글루신(식약청고시) 80mg

■ 성 상
백색 또는 미황색의 원형설하정

■ 효능·효과
1 비뇨기계의 경련 및 통증·신염성 산통
2 소화관 및 담도계의 기능장애에 의한 통증
3 부인과의 경련성 통증
4 임신중 수축의 보조치료

■ 용법·용량
성인 : 플로로글루신으로서 1회 160mg
을 물 한 컵에 녹이거나 설하에 넣어 증상
발현시에 경구 투여한다.
소아 : 1회 80mg을 물 한 컵에 녹여 1일
2회 투여한다.
연령,증상에 따라 적절히 증감한다.



분리배출



전문의약품
분류번호:124

제조발매원
HB한불제약주식회사
서울시 송파구 송파동 135-3 한불빌딩
공장:경기도 안성시 원곡면 반제리 40-8
대표전화 : (02)421-7266



■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 과민증환자
2. 부작용
 - 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구갈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다
 - 2) 피부 : 알레르기반응이 나타날 수 있다.
 - 3) 기타 : 드물게 기분불량, 복시 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.
3. 상호작용
이 약은 진경작용을 나타내므로 모르핀 또는 그 유도체와 같은 진통제와는 병용 투여하지 않는 것이 바람직하다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물실험에서 태자독성 및 기형발생은 나타나지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인(특히 초기 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 2) 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

■ 저장방법

밀폐용기, 차광보존

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 경로를 통하여 교환하여 드립니다.

개정년월일:2005.05.10

제조번호:

사용기한: