

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정중
알리벤돌 (식약청 고시).....100mg

■ 성상
연녹색의 원형 당의정

■ 효능 · 효과
주효능 효과
소화불량, 구역, 구토, 변비등의 증상치료

■ 용법 · 용량
성인 : 알리벤돌로서 1일 300~400mg을
3~4회 분할하여 식전 및 취침시 경구 투여
한다. 연령,증상에 따라 적절히 증감한다.



분리배출



8 806112 602529

이담소화제

알리신정

(알리벤돌)

Alisin Tab.

(Alibendol)

1000T

전문의약품

분류번호:239

제조발매원
IB 한불제약주식회사

서울시 송파구 송파동 135-3 한불빌딩
공장:경기도 안성시 원곡면 반제리 40-8
대표전화 : 02)421-7266



■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로
이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는
신중히 투여한다.
2. 일반적 주의
1) 다른 약물을 투여하고 있는 경우에는 투여하기 전에
약사 또는 의사와 상의한다.
2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는
투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
3. 소아에 대한 투여
이 약은 7세 미만의 영,유아에게 경구 투여하지 않는다.
4. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한
곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에
바꾸어 넣지 않는다.

■ 저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시
사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될
경우에는 구입한 경로를 통하여 교환하여 드립니다.

개정년월일:2003.11.10

제조번호 :

사용기한 :