새로운 빈혈치료제

아네톤정

일반의약품
분류번호322

Aneton Tab.

아네톤정은 미세한 입자로 구성된 순수철의 빈혈치료제입니다.
아네톤정은 위산에 따라 철이온이 서서히 지속적으로 유리되어 흡수되므로 위장장애가 적고 타 철분제제에 비하여 독성이 매우 낮아 부작용을 거의 나타내지 않습니다.

【원료약품의 분량】 1정 중
카르보닐철(식품의약품안전청고시 제2001-11호) ····· 51밀리그람
(철로서 50mg)

【성 상】 적색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】
철결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법·용량】
성인 및 12세 이상의 소아 : 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】
1. 경 고
   철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.
2. 다음 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.
   1) 소화성궤양, 만성궤양성 대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자.
   2) 1세 미만의 유아.
   3) 의사의 치료를 받고 있는 환자.
3. 복용시에는 다음 사항을 주의할 것.
   1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
   2) 소아에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용할 것
4. 복용 중 또는 복용 후 다음 사항에 주의할 것.
   1) 이 약의 복용에 의해 구역, 구토, 식욕부진, 복통, 설사, 변비, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있다.
   2) 이 약의 복용에 의해 두드러기, 가려움증, 광선과민증 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 할 것.
   3) 테트라사이클린계 항생제, 제산제와는 동시에 복용하지 말 것.
   4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.
   5) 일정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의할 것.
5. 보관상의 주의
   1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있는대로 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관할 것.
   3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법 및 사용(유효)기간】 실온보관(1-30℃), 기밀용기
사용기간 : 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과 되었거나 유통과정중 변질, 변폐 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원 을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 개발부로 문의해 주시기 바랍니다. Tel:02-876-7777(대)

생명공학 벤처제약기업
newgenpharm (주)뉴젠팜
본사 : 서울시 관악구 봉천7동 1596-7

우수의약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체

작성년월일:01.12.20 P-3-2-176 0001