분류번호	114
전 문 의 약 품	

최초투여되는 항류마티스 / 골관절염 요법제

아 엔 탈 정 AENTAL Tab.

(아세클로페낙) (Aceclofenac)

아엔탈은 골관절염, 류마티스관절염 및 각종 염증성 질환에 사용할 수 있는 진통·소염제로서 COX-2에 대한 선택성이 높아, 염증부위에서의 효과는 강한 반면, 위점막에서의 prostaglandin차단작용은 둔화시켜 위장장애의 문제점을 개선하였으므로, 관절염 치료는 **아엔탈**로 시작하는 것이 바람직합니다.
일반적으로 관절염은 관절부위의 염증으로 인하여 관절이 붓고, 아침에 관절이 뻣뻣해지는 등 움직이기가 힘들고 또한 통증을 수반함으로써,일상생활의 지장은 물론이고, 불면 등 삶의 질에도 상당한 타격을 주게 됩니다.
아엔탈은 노인환자나 장기복용자들도 안심하고 복용할 수 있는 안전한 약물입니다.

【성분·함량】 1정 중,
아세클로페낙(EP) ····· 100mg

【성　　상】 백색의 원형 필름코팅정

【약리작용 및 특징】
1. 인체에 수용가능성이 높은, 가치있는 약물
   급·만성 염증성 관절질환 및 퇴행성 관절염의 치료에 있어서, 아엔탈은 효과적이면서도 내약성이 좋아 대부분의 환자가 잘 받아들일 수 있는 약물입니다. 이러한 낮은 부작용 발생과 강력한 항염증작용을 가진 약물을 처방할 수 있음은, 처방의사 및 환자에게 상당한 가치를 가집니다.
2. 위장장애의 최소화
   아엔탈은 COX-2에 선택성이 높아 위점막을 보호하는 PG는 억제하지 않음으로써, 위장장애를 최소화하였습니다. 따라서, 관절염치료제의 장기복용을 요하는 환자도 안심하고 복용할 수 있습니다.
3. 연골파괴를 방지하고 연골성분 생성촉진
   아엔탈은 관절연골을 파괴하는 인터루킨-1의 생성을 억제시키고, 관절연골구성성분인 글리코사미노글리칸의 생성을 촉진시켜 관절이 약화되는 것을 방지할 수 있습니다.

【효능·효과】
류마티스양 관절염, 강직성 척추염, 골관절염 및 견갑상완골의 관절 주위염, 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 회음 외측 절개수술후, 분만후, 비관절성 류마티즘으로 인한 통증

【용법·용량】
통상 성인의 경우 1회 1정, 1일 2회(12시간마다) 복용한다.
단, 의사나 약사의 지시에 따라 복용량과 횟수를 조절할 수 있다.
반드시 정제는 씹어먹지 않도록 한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 100정(병), 500정(병)

【사용상의 주의사항】
1. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
2. 다음의 환자에는 투여하지 말 것
   (1) 본 제제 또는 같은 계열의 일부 약물(디클로페낙)에 대해 알레르기 증상이 있는 환자
   (2) 다른 비스테로이드성 소염제와 마찬가지로 아세틸살리실산 및 기타 프로스타글란딘 합성효소 저해작용을 갖는 약물에 의해 천식 위험의 증가, 담마진 또는 급성 비염을 일으킬 수 있는 천식환자

→ 뒷면참조

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.

(작성일자: 2003. 8. 30)

제조발매원
JIN YANG PHARM.CO.
진양제약주식회사
본사 : 서울특별시 서초구 서초3동 1532-9
공장 : 경기도 안산시 단원구 초지동 649-3
소비자상담실 : (02)3473-7185

(3) 활동성 위 · 십이지장 궤양이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

(1) 위장관의 질병이나 과거 위궤양의 경험이 있는 환자
(2) 심한 간경련, 심장 또는 신장의 병변을 가진 환자
(3) 이뇨제를 복용중인 환자
(4) 외과적 처치 후에 회복기에 있는 환자
(5) 고령자

4. 부작용

일시적으로 경미한 위복부 통증, 구토, 오심, 위부포만감 등이 나타나며 때때로 발진, 발적, 담마진, 야뇨현상의 증가를 비롯하여 두통, 현기증, 졸음 또는 피로가 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

현기증 혹은 기타 중추신경계의 장애를 느끼는 환자의 경우는 운전을 하거나 어떤 위험한 기계를 다루는 일도 해서는 안되며 특별한 주의를 요하는 환경을 피한다.

6. 상호작용

다른 약물과의 상호작용은 아직까지 알려진 바 없으나 환자가 다른 약물 특히 리튬이나 디곡신, 항응고제, 경구용 당뇨병제, 이뇨제 또는 다른 진통제를 복용하고 있는 경우에는 의사와 상의한다.

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여

(1) 임산부 또는 수유부에 대한 안전성은 현재까지 알려진 자료로는 충분히 확립되어 있지 않으므로 임신 혹은 수유중인 경우에는 사용하지 않는 것이 좋다.
(2) 6세 이하의 소아에 대해서는 정해진 복용량이나 적응증이 설정되어 있지 않다.

8. 과량투여시의 처치

과량복용으로 인한 전형적인 증상은 알려져 있지 않으나 실수로 과량복용시에는 관찰되는 증상에 따라 처치하도록 해야하며, 위장관자극, 저혈압, 호흡저하, 경련 등에 대비하도록 한다.