골격근 이완제

메 다 몰 정
Medamol Tab

250밀리그람
500밀리그람 (메토카르바몰)

250mg 일반의약품
500mg 전문의약품
분 류 번 호 : 122

	250밀리그람	500밀리그람
	1정 300밀리그람중	1정 600밀리그람중
■ 성분 · 함량		
메토카르바몰(약전)	250mg	500mg
■ 성 상 :	백색의 원형정제	백색의 타원형정제

■ 효능 · 효과

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축 : 요배통증, 경견완증후군, 견관절주위염, 변형성척추증

■ 용법 · 용량

성인 : 메토카르바몰로서 1일 1.5-2.25g을 3회에 분할 경구투여한다. 소아에는 1일 체중 ㎏당 60㎎을 초과하지 않는다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 이 약 또는 유사화합물(메프로바메이트 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
   2) 신장애 또는 신장애가 의심되는 환자
   3) 중증의 근무력증 환자
   4) 혼수 또는 전혼수상태 환자
   5) 뇌손상, 간질 또는 경련의 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   간장애 환자(중상을 악화시킬 수 있다.)
3. 부작용
   1) 과 민 증 : 때때로 발진, 두드러기, 가려움, 드물게 쇽유사증상 등의 증상이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
   2) 순 환 기 계 : 때때로 서맥, 혈압저하 등이 나타날 수 있다.
   3) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 휘청거림, 운동실조, 두통, 두중감, 졸도, 실신, 드물게 시력불선명 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
   4) 소 화 기 계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 가슴쓰림, 위정체감, 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
   5) 감 각 기 계 : 때때로 금속성의 미감을 느낄 수 있다.
   6) 기 타 : 발열, 비충혈이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   졸음, 주의력, 집중력, 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용
   1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 단독투여하는 것이 바람직하나 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 주의한다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO 저해제
   2) 염산톨페리손과 병용투여시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
   1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.
   2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
7. 소아에 대한 투여
   영 · 유 · 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어있지 않다.
8. 고령자에 대한 투여
   일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
9. 임상검사에 대한 영향
   요중 5-히드록시인돌조산 및 요중 바닐만델산치를 상승시킨다.

■ **저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1～30℃)**

■ **사용기간 : 제조일로부터 36개월**

■ **포장단위 : 자사포장단위**

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한 경과 하였거나 유통과정중 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
제품에 관한 문의는 전화 (02) 3473-6365)로 하시기 바랍니다.

설명서작성년월일: 2003.05.02
설명서개정년월일: 2006.10.17

약은 어린이의 손이 닿지않도록 보관하여야 합니다.

제조발매원
주식회사 넥스팜코리아
충북 진천군 문백면 장월리 112-3

KGMP
적격업체제품