KGMP지정업소

전 문 의 약 품
분류번호 : 141

졸음 걱정 없는 제2세대 항히스타민제

로 라 닐 정

Loranil Tab.

(로 라 타 딘)

로라닐정은 선택적으로 말초 H_1 - 수용체에 작용하는 항히스타민제제로, 유리된 히스타민에 의해 발생하는 알레르기성 비염, 두드러기의 증상을 경감시키는 제제입니다.
로라닐정은 제2세대 항히스타민제로 진정작용이 적어서 일상생활에 지장이 없으므로, 운전자 및 수험생 등에도 졸음 걱정 없이 안심하고 투여할 수 있습니다. 약효 발현이 신속하며, 지속시간이 길어서 복용하기에도 편리합니다.

【원료약품 및 그 분량】
1정 중
로라타딘 (식약청고시 제2000-14호) ····· 10mg

【성　　상】
백색의 원형 정제

【작　　용】
1. H_1 - 수용체에 히스타민과 경쟁적으로 결합하여, 유리된 히스타민이 유도하는 알레르기 반응을 억제합니다.
2. 졸음 걱정없이 투여할 수 있습니다.
   BBB(혈액뇌관문, Blood Brain Barrier)를 통과하지 못하기 때문에, 주로 말초에서 작용하여 진정반응 등의 부작용이 적습니다.
3. 약효 발현이 신속합니다.
   흡수가 신속히 이루어져 1~3 시간 이내에 약효 발현이 시작되고, 최대 효과 발현은 8~12 시간 지속됩니다.
4. 약효 지속시간이 깁니다.
   약효 지속시간이 24 시간 이상으로, 1일 1회 1정으로 충분한 효과를 얻을 수 있습니다.

【효능 · 효과】
알레르기성 비염 (재채기, 코막힘, 가려움, 눈의 작열감), 만성 특발성 두드러기

【용법 · 용량】
· 성인 및 12세 이상의 소아 : 로라타딘으로서 1일 1회 10mg을 경구투여한다.
· 6~12세 미만의 소아
  체중 30kg 이상 : 이 약으로서 1일 1회 10mg 투여한다.
  체중 30kg 이하 : 이 약으로서 1일 1회 5mg 투여한다.
  연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 이 약에 과민증 환자
   2) 6세미만의 소아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   간장애 또는 신부전 환자
3. 부작용
   이 약과 위약과의 비교 임상시험에서 진정작용, 항콜린작용이 관찰되었고 피로, 구역, 두통, 빈맥, 실신, 구갈, 위장장애, 식욕증진 등이 보고 되었다. 그 밖에 탈모증, 아나필락시스, 간기능 장애, 상실성 부정빈맥 등이 나타난다.
4. 일반적주의
   만일 피부자극 시험을 할 경우에는 항히스타민제제들이 피부반응 표시기에 양성반응을 방해 및 감소시킬 수 있으므로 피부시험 실시 약 4일 전에는 투여하지 않는다.
5. 상호작용
   이 약과 시메티딘, 에리스로마이신, 케토코나졸, 퀴니딘, 플루코나졸, 플루옥세틴과 병용투여시 이 약의 대사가 저해되어 혈중 농도가 높아진다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
   1) 임부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.
   2) 이 약이 모유중으로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않는다.
7. 과량투여시의 처치
   과량을 투여했을 때에는 즉시 대증요법과 지지요법을 시작하여야 한다. 환자가 자발적으로 구토를 일으키지 않더라도, 구토를 유발시켜야 한다.(토근을 이용하는 방법이 우선적으로 사용된다.) 그러나 의식장애가 있는 환자에게 구토를 유도하여서는 안된다. 구토후에 활성탄과 물을 희석하여 투여할 수도 있다.
   만일 구토가 성공적이지 못하거나 금기사항일 경우는 위세척을 실시하여야 한다. 이 약은 투석으로는 제거되지 않는다. 응급처치 이후 환자는 지속적으로 관찰되어야 한다.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】

500정

※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 등 의약품 판매업소에 한하여 본사(☎6207~6114) 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.

작성년월일 : 2003. 03. 19 PR1710303

제조발매원
(株) 柳英製藥
충북 진천군 광혜원면 죽현리 492-17