※ 의약품을 사용하시기 전 아래의 내용을 주의깊게 읽으시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

말레인산트리메부틴(식약청고시 제98-127호)·····150mg

【성 상】 백색의 원형정제

【효능 • 효과】

1. 주효능 • 효과
   1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
   2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
   3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면 장애

   ※ 위의 효능 • 효과 이외에 다른 용도로 사용시 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.

【용법 • 용량】 성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100-200 mg 1일 3회 식전에 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 부작용
   1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
   2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
   3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통등이 나타날 수 있다.
   4) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
   5) 과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
2. 임부에 대한 투여
   임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

포리부틴® 정

(말레인산트리메부틴)

150mg

500정

제조발매원
samil 삼일제약 | 주
공장 : 경기도 안산시 단원구 원시동 772-1

보험코드:A05003151

PB18512-2003-2

의약품 분류번호	239 기타의 소화기관용약

「일반의약품」

3. 수유부에 대한 투여
   수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【포장단위】 500 정

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【재질】 용기 - HDPE
뚜껑 - LDPE

HDPE
분리배출

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 말고, 뚜껑을 꼭 닫아서 보관하십시오.

「변질 · 변패되었거나 사용기간이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.」

♣ 소비자 상담전화 : 080-520-3131
http://www.samil-pharm.co.kr

〈표기사항개정년월일 :2003년 6월〉

제조번호 :

사용기한 :

8 806038 102417