■ **성분 · 함량** (1정 중)
치옥트산(Thioctic Acid)(식약청고시)·····200mg

■ **성　　상**
녹색의 원형 필름코팅정

■ **효능 · 효과**
당뇨병성 다발성 신경염의 완화

■ **용법 · 용량**
특별한 처방이 없는 한 약간의 물과 함께 1회 1정, 1~3회 매일 복용하십시오.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
지금까지 α - lipoic acid 에 대해 알려진 과민증이 있는 환자.

2. 부작용
1) 드물게 피부과민성이 보고된 바 있습니다.
2) glucose 이용율 증가에 의해 혈당치가 떨어지는 경우가 있습니다.

3. 상호작용
1) 이 약물치료 중에는 알코올과 알코올의 대사물에 의해 치료효과가 약화될 수 있으므로 절대 금주가 필요합니다.
2) 이 약의 치료와 동시투여로 인해 cisplatin(in vitro상에서 금속착체를 형성함)의 작용이 감소될 수 있습니다.
3) 인슐린이나 다른 경구용 당뇨병약의 작용으로 인해 혈당치의 감소작용이 증가 될 수 있으므로 치료의 초기에 혈당치의 엄격한 조절이 필요하며 당 결핍 증상을 피하기 위하여 인슐린의 양이나 경구용 당뇨병약을 줄여야 할 경우도 있습니다. (α - lipoic acid는 당분자와 불용성착체를 형성합니다.)

4. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 생식독성 연구결과 아무런 태생 독성도 나타내지 않으나 임신부에 대한 적용의 경험이 적기 때문에 임신중에 약물 투여는 의사와 상담 후에만 결정하도록 하십시오.
2) 약물의 모유중으로의 이행은 알려진 바가 없기 때문에 이 수유기에는 투여하지 마십시오.

■ **저장방법 및 사용기간**
차광밀폐용기, 실온보관 (1~30℃), 3년

재 질 : 용기-HDPE, 마개-LDPE

※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■ **제품문의** (02)2242-0491~9

본사 : 서울특별시 동대문구 장안 2동 315-18
공장 : 충청북도 충주시 앙성면 본평리 산 5-1

8 806109 531122

HDPE
분리배출

제 조 번 호 :

사 용 기 한 :

전문의약품　**500정**　분류번호:399

당뇨병성 다발성 신경염의 완화

다이뉴정

(치옥트산)

코스닥등록기업
신일제약주식회사
http://www.sinilpharm.com