전문의약품

항혈소판제

안국실로스타졸정

분류번호 339

(실로스타졸)

■ 원료약품의 분량 : 1정 중
실로스타졸(별규) ····· 50mg

■ 성　　상 : 백색의 원형정제입니다.

■ 약리작용
1. 혈소판응집 억제작용 : ADP, collagen, epinephrine, arachidonic acid 등에 의한 혈소판 응집을 강력하게 억제합니다.
2. 혈관확장작용 : 동맥을 확장시켜 혈류량을 증가시킵니다.
3. 혈관평활근 세포증식 억제작용 : 실로스타졸은 혈관평활근 세포에 대하여 세포증식 억제작용을 가지고 있습니다.
4. 혈장TG 저하작용 : 실로스타졸은 혈장내 triglyceride 저하작용을 나타냅니다.

■ 특장점
1. 혈소판응집을 억제하여 뛰어난 항혈전효과를 나타냅니다.
2. 하지 혈류량을 증가시켜 말초의 혈행동태를 개선합니다.
3. 만성 동맥폐쇄증(버거씨병, 폐색성 동맥경화증, 당뇨병성 말초혈관 병증 등)에 의한 궤양, 동통, 냉감 등의 허혈성 제 증상을 개선합니다.
4. 1일 2회 투여로 뛰어난 임상효과를 얻을 수 있습니다.

■ 효능 . 효과
만성동맥폐색증(버거씨병, 폐색성 동맥경화증, 당뇨병성 말초혈관병증 등)에 의한 궤양, 동통 및 냉감 등의 허혈성 제증상의 개선

■ 용법 . 용량
통상 성인 실로스타졸로서 1회 100밀리그람을 1일 2회 경구 투여합니다. 단, 연령 · 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 사용상의 주의사항
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 1) 출혈이 있는 환자(혈우병, 모세혈관 위약증, 상부소화관 출혈, 요로 출혈, 객혈, 초자체 출혈 등) (출혈을 조장할 우려가 있습니다.)
 2) 울혈성 심부전 환자(증상을 악화시킬 우려가 있습니다.)
 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민증의 병력이 있는 환자
 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 ('임부 수유부에 대한 투여' 항 참조)
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 1) 항응고제(와파린 등), 혈소판응집을 억제하는 약제(아스피린, 티클로피딘 등), 혈전용해제(유로키나제, 알테플라제 등), 프로스타글란틴 E1 제제 및 그 유도체(알프로스타딜, 리마프로덱스, 알파덱스 등)를 투여중인 환자(출혈을 조장할 우려가 있으므로 혈액응고등 검사 등을 충분히 시행하면서 사용합니다.)
 2) 월경기간 중의 환자(출혈을 조장할 우려가 있습니다.
 3) 출혈경향 및 그러한 소인이 있는 환자(출혈을 조장할 우려가 있습니다.)
 4) 중증의 간장애나 신장애가 있는 환자(실로스타졸의 혈중농도가 상승할 우려가 있습니다.)
3. 이상반응
 1) 중대한 이상반응
 ①뇌출혈, 폐출혈, 안저출혈, 때때로 피하출혈, 또는 드물게 소화관 출혈, 비출혈, 혈뇨 등의 출혈 경향이 나타날 수 있습니다. 이와 같은 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 ②범혈구감소증, 무과립구증, 드물게 혈소판감소증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 행하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 ③드물게 발열, 해소, 호흡곤란, 흉부 X선이상, 호산구 증가를 동반한 간질성 폐렴이 나타날 수 있습니다. 이와같은 경우에는 투여를 중지하고 부산피질호르몬제의 투여 등의 적절한 처치를 하십시오.
 ④울혈성 심부전, 심근경색, 협심증, 심실빈맥 등이 나타났다는 보고가 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 ⑤때때로 AST, ALT, ALP, LDH 등의 상승과 황달이 나타나는 일이 있으므로 관찰을 충분히 행하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 2) 그 외의 이상반응

①과민증 : 때때로 발진, 또는 드물게 피진, 두드러기, 가려움증과 광과민증이 나타날 수 있습니다. 이런 경우는 투여를 중지하십시오.
②순환기계 : 심방세동, 상실성 빈맥, 심실성 기외수축 등의 부정맥, 혈압저하, 때때로 동계, 빈맥, 화끈거림, 또는 드물게 혈압상승이 나타날 수 있습니다. 이와 같은 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
③정신신경계 : 진전, 때때로 두통, 두중감, 현기증, 또는 드물게 불면, 졸음, 저린감이 나타날 수 있습니다. 이런 경우에는 감량하거나 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
④소화기계 : 때때로 복통, 구역, 식욕 부진, 설사 또는 드물게 속쓰림, 복부팽만감이 나타날 수 있습니다.
⑤혈액 : 드물게 빈혈, 백혈구 감소가 나타날 수 있습니다.
⑥신장 : 드물게 BUN, 크레아티닌, 요산치의 상승 등이 나타날 수 있습니다.
⑦기타 : 발열, 때때로 발한, 부종 또는 드물게 혈당 상승, 흉통, 여명, 동통, 권태감, 탈력감, 결막염, 빈뇨가 나타날 수 있습니다.

4. 상호작용
1) 항응고제(와파린 등)(출혈을 조장할 우려가 있습니다.)
2) 혈소판응집을 억제하는 약제(아스피린, 티클로피딘 등) (출혈을 조장할 우려가 있습니다.)
3) 혈전용해제(유로키나제, 알테플라제 등) (출혈을 조장할 우려가 있습니다.)
4) 프로스타클란딘 E1제제 및 그 유도체(알프로스타딜, 리마프로스트, 알파덱스 등) (출혈을 조장할 우려가 있습니다.)
5) 약물대사효소(CYP3A4)를 저해하는 약물 등(에리스로마이신, 시메티딘 등, 자몽쥬스)과 병용에 의하여 이 약의 혈중 농도가 상승하여 작용이 증가할 우려가 있습니다. 병용하는 경우에는 감량 혹은 저용량부터 시작하는 등 주의해야 하며, 또한 자몽쥬스와 동시 복용하지 않도록 주의하십시오.
6) 약물대사효소(CYP3A4)의 기질이 되는 약물(딜티아젬 등)과 병용에 의하여 이 약의 혈중 농도가 상승하여 작용이 증가할 우려가 있습니다. 병용하는 경우에는 감량, 혹은 저용량부터 시작하는 등 주의해야 하며 또한 자몽쥬스와 동시 복용하지 않도록 주의하십시오.
7) 약물대사효소(CYP3A4)를 저해하는 약물(오메프라졸 등)과 병용에 의하여 이 약의 혈중 농도가 상승하여 작용이 증가할 우려가 있습니다. 병용하는 경우에는 감량, 혹은 저용량부터 시작하는 등 주의해야 하며 또한 자몽쥬스와 동시 복용하지 않도록 주의하십시오.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 동물실험(랫트)에서 이상태자의 증가 및 출생시의 저체중 및 사망자의 증가가 보고되었으므로 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않습니다.
2) 동물(랫트)에서 유즙중으로의 이행이 보고되었으므로 투여 중에는 수유를 피하십시오.

6. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.)

7. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

8. 기타
1) 이 약은 PDEⅢ 저해작용을 가지는 약물입니다. 외국에서는 PDEⅢ 저해 작용을 가지는 감심제에 관하여 울혈성 심부전(NYHA 분류 Ⅲ~Ⅳ) 환자를 대상으로한 장기투여비교시험에서 PDEⅢ 저해작용을 가지는 강심제에서의 생존률이 플라세보에 비하여 낮았다는 보고가 있습니다.
2) 비글을 이용한 13주간 및 52주간 반복경구투여시험에서 고용량에서 심내막의 비후, 관상동맥의 장애가 인정되었으며 무독성량은 각각 30mg/Kg/day, 12mg/Kg/day였다. 또한 이러한 변화는 랫트 및 원숭이에서는 인정되지 않아 개에 특이적인 변화라고 생각되며 다른 PDE 저해제와 혈관확장제에서도 인정되었습니다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
■ 포장단위 : 자사포장단위
■ 사용기한 : 외부포장참조
※ 약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■본 제품은 재정경제부가 고시한 소비자피해보상규정에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다. 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 교환하여 드리오니 담당 사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다. 안국약품(주)
• 소비자 상담실 TEL. (02)3289-4253~9, 4275~7 • 수신자부담 Tel. 080-001-4125

AG051006

건강의 등불
안국약품(주)
• 본사: 서울특별시 영등포구 대림동 993-75 • 공장: 경기도 화성시 향남면 상신리 903-2