엘도란트 캡슐

전문의약품

급·만성 호흡기질환 치료제
에르도스테인 제제

작 용 · 특 성 : **엘도란트 캡슐**은 담중의 thiol 결합을 분해하여 담을 묽게하고, 섬모 운동을 촉진시킴으로써 객담의 배출을 쉽게 하여 신속하고 우수한 거담 효과를 나타내는 급·만성 호흡기질환 치료제입니다.

엘도란트 캡슐은 기관지와 폐포의 파괴를 막아주며, 호흡기 면역물질인 IgA의 양을 증가시키고, 인체내 생리적 항균물질인 lysozyme, lactoferrin의 양을 증가시켜 근본적으로 호흡기를 강화시켜 줍니다. 이에 따라 만성기관지염의 재발을 감소시키며, 악화를 예방하는 효과를 발휘합니다.

엘도란트 캡슐은 pro-drug으로서 거담제의 공통적인 부작용인 위장장애가 없으며, 항생제와 병용시 담중의 항생제 농도를 높여줌으로써 상승작용을 발휘해 치료기간을 단축시켜 줍니다.

조 성 · 성 상 : **1. 원료약품의 분량 :** 매 캡슐당

에르도스테인 (별규) ····· 300mg

2. 성상 : 백색의 분말이 들어있는 상부 녹색, 하부 황색의 경질캡슐제

효 능 · 효 과 : 급·만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

용 법 · 용 량 : 1일 2~3회, 1회 1캡슐씩 복용하십시오.

사 용 상 의 주 의 사 항 : **1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.**

1) 동성분에 과민증이 있는 환자
2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소 (cystathionine synthase) 결핍환자

2. 부작용

사용량(1200mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조홍이 나타났습니다.

3. 상호작용

항생제, 기관지 확장제(테오필린, β_2-효능약, 기침완화제 (cough sedative) 등)와 병용할 수 있습니다.

4. 임부 · 수유부에 대한 투여

임신중, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

저 장 방 법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

포 장 단 위 : **엘도란트 캡슐** ····· 10, 100캡슐

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

I01 · 062003

종근당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)