

# 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.  
1) 동성분에 과민증이 있는 환자 2) 과당불내성 환자(소르비톨 성분 함유)
2. 이상반응  
드물게 감미제로 사용된 소르비톨 성분으로 인하여 소화장애 및 설사가 일어날 수 있다.
3. 상호작용  
본 제제와 타 약제와의 병용투여시 현재까지 알려진 이상반응은 없다.
4. 임부·수유부에 대한 투여  
임부·수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
5. 소아에 대한 투여  
2세 미만의 소아에 대한 투여는 의사의 지시에 따른다.
6. 저장상의 주의사항  
소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품은 "우수외약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 외약품입니다. 만약 구입시 사용(유통)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2007년 07월 11일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(080-855-0114)로 문의하시기바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2007년 07월 11일



제조의뢰자

**대화제약주식회사**

우수외약품제조관리기준  
KGMP적격인증제품

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호  
공정·광원도 행정로 행정읍 마산리 308  
http://www.dhpharm.co.kr

**DAE HEDERA SYRUP**  
**500mL**

일반의약품

**대화 헤 데 라** 시럽

염증성 기관지염 치료제

분류번호 222



아이비엽70%에탄올유동엑스

염증성 기관지염 치료제

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

아이비엽70%에탄올유동엑스(별규).....2g

(헤데라코시드로서 40.0mg)

소르빈산칼륨(NF).....0.2g

【성 상】 오렌지향이 있는 갈색의 시럽제

【효능·효과】

호흡기의 카타르, 만성 염증성 기관지 질환의  
제증상 치료

〈다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다〉

【용법·용량】


· 10세 이상 성인 : 1일 3회, 1회 5mL

· 4~10세 : 1일 4회, 1회 2.5mL

· 1~4세 : 1일 3회, 1회 2.5mL

· 1세 이하 : 1일 2회, 1회 2.5mL

【포장단위】 500mL



8



제조사

**한국콜마**

충남 연기군 천의면 신정리 618-3



분리배출

제 조 번 호 :

사 용 기 한 :