

비그만정

■원료약품의 분량 : 1정 중

방풍통성산건조엑스(별규) 237.5mg

■성상 : 미색 내지 미황색의 원형 필름코팅정

■효능·효과

복부에 피하지방이 많고 변비기가 있는 사람의 다음 제증 :
비만증, 변비, 고혈압의 수반증상(동계, 어깨결림, 역상), 부종

■용법·용량

성인 1일 3회, 1회 4정씩 식전 또는 식간에 복용합니다.

■사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담 하십시오.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 글리시리진산으로서 40mg 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 관촬(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지 하십시오.
- 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관촬을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의 하십시오.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.

4. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 병후의 쇠약기, 몸이 허약한 환자(부작용이 나타나기 쉬우며, 그 증상의 악화될 우려가 있습니다.)
- 2) 위장이 허약한 환자 (식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 연변, 설사 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)
- 3) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자 (증상이 악화될 우려가 있습니다.)
- 4) 발한경향이 현저한 환자 (발한과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있습니다.)
- 5) 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력 환자
- 6) 중증 고혈압 환자 또는 고령자
- 7) 중증 신장애 환자
- 8) 부종이 있는 환자
- 9) 배뇨장애 환자
- 10) 갑상선기능항진증 환자
- 11) 지금까지 약에 의한 발진 발적, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 12) 임부나 임신중이라고 생각되는 부인
- 13) 의사의 치료를 받고 있는 환자

5. 부작용

- 1) 위알도스테론증 : 글리시리진산으로서 1일 최대량 40밀리그램 이상을 함유하는 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관촬(혈청칼륨치의 측정 등)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 칼륨제 투여 등의 적절한 처치를 합니다.
- 2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로 근병증이 나타나는 일이 있으므로 관촬을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 칼륨제 투여 등의 적절한 처치를 합니다.
- 3) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관촬을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
- 4) 과민증 : 발진, 가려움 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 경우는 투여를 중지합니다.
- 5) 자율신경계 : 불면, 발한과다, 빈뇨, 심계항진, 전신무력감, 정신흥분 등이 나타날 수 있습니다.
- 6) 소화기 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등이 나타날 수 있습니다.
- 7) 비뇨기 : 배뇨장애 등이 나타날 수 있습니다.

6. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어 환자의 증(證)(체질, 증상)을 고려하여 투여하며, 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다. 또한 경과를 충분히 관찰하고 복용 후 증상의 개선이 인정되지 않는 경우에는 계속 투여를 피하고 의사나 약사에게 상담합니다.
- 2) 변비에 복용할 경우에 1주간 복용해도 증상의 개선을 볼 수 없는 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사에게 상담합니다.
- 3) 변비 이외의 증상에 복용할 경우에 1개월 정도 복용해도 증상의 개선을 볼 수 없는 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사에게 상담합니다.
- 4) 장기 연용할 경우에는 의사나 약사에게 상담합니다.
- 5) 이 약 복용에 의해 설사, 복통, 위부불쾌감, 발진, 발적, 등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사에게 상담합니다.
- 6) 이 약을 복용함에 따라 요량이 감소하거나 얼굴이나 수족이 붓거나 눈꺼풀이 무겁게 되거나 손이 굳거나, 혈압이 높게 되거나 두통 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사에게 상담하십시오.
- 7) 다른 한방제제 등과 병용투여할 경우 함유 생약의 중복에 주의해야 합니다. 대황 함유제제와 병용투여시 특히 주의하십시오.
- 8) 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의하십시오.

7. 상호작용

- 1) 생약함유제제, MAO저해제, 갑상선제제(치록신, liothyronine), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 코산틴계제제(테오필린, 디프로필린)와 병용투여시 불면, 발한과다, 빈뇨, 심계항진, 전신무력감, 정신혼란 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량하는 등 신중히 투여하십시오.
- 2) 칼륨함유제제 및 글리시리진산 혹은 그 염류 함유 제제와 병용투여시 위알도스테론증이 나타나기 쉬우며, 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.
- 3) 다음의 약제와는 병용하지 마십시오 : 다른 사하제(하제)

8. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축 작용 혹은 골반내 장기의 유출작용에 의해 유·조산의 위험이 있습니다.)
- 2) 이 약에 함유되어 있는 대황 중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 유아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유부는 신중히 투여합니다.

9. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

10. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

11. 저장상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고, 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오염을 피하고 품질을 보존하기 위하여 다른 용기에 바꾸지 마십시오.

■저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■포장단위 : 자사 포장단위

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 <http://www.dreampharma.co.kr>나 수신자부담문의전화 080-729-5800에서 확인할 수 있습니다.

※설명서 작성년월일 : 2001. 05. 22.
※설명서 개정년월일 : 2007. 01. 03.

