비스테로이드성 소염·진통제

아세클 정

(아세클로페낙)

전문의약품

Aceclofenac

Acecle Tab.

분류번호:114

아세클정은 약 95%정도의 높은 생체이용률을 나타내며 염증조직으로 약물침투가 뛰어날 뿐만 아니라 병소부위의 Prostaglandin생합성을 차단하여 진통, 소염효과를 나타냅니다. **아세클정**은 관절 연골성분인 GAG(Glycosaminoglycan)의 생성을 촉진하여 관절연골을 보호하여 줍니다. 또한, COX-2에 선택적인 저해작용을 나타내어 기존 NSAIDs의 문제점인 위장장애가 매우 적은 소염·진통제입니다.

■원료약품의 분량 (1정 중)

아세클로페낙(E.P.) ---------- 100mg

■성 상 : 백색의 원형 필름코팅 정제

■효능·효과

류마티스양 관절염, 강직성 척추염, 골관절염 및 견갑상완골의 관절 주위염, 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 회음 외측 절개 수술후, 분만후, 비관절성 류마티즘으로 인한 통증

■용법·용량

통상 성인의 경우 1회 1정, 1일 2회(12시간마다) 복용한다.
단, 의사나 약사의 지시에 따라 복용량과 횟수를 조절할 수 있다.
반드시 정제는 씹어먹지 않도록 한다.

■사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음의 환자에는 투여하지 말 것.

1)본 제제 또는 같은 계열의 일부약물 (디클로페낙)에 대해 알레르기 증상이 있는 환자

2)다른 비스테로이드성 소염제와 마찬가지로, 아세틸살리실산 및 기타 프로스타글란딘 합성효소 저해작용을 갖는 약물에 의해 천식 위험의 증가, 담마진 또는 급성 비염을 일으킬 수 있는 천식환자

3)활동성 위십이지장 궤양이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1)위장관의 질병이나 과거 위궤양의 경험이 있는 환자

2)심한 간경련, 심장 또는 신장의 병변을 가진 환자

3)이뇨제를 복용중인 환자

4)외과적 처치 후에 회복기에 있는 환자

5)고령자

4. 부작용

일시적으로 경미한 위복부 통증, 구토, 오심, 위부포만감 등이 나타나며 때때로 발진, 발적, 담마진, 야뇨현상의 증가를 비롯하여 두통, 현기증, 졸음 또는 피로가 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

현기증 혹은 기타 중추신경계의 장애를 느끼는 환자의 경우는 운전을 하거나 어떤 위험한 기계를 다루는 일도 해서는 안되며 특별한 주의를 요하는 환경을 피한다.

6. 상호작용

다른 약물과의 상호작용은 아직까지 알려진 바 없으나 환자가 다른 약물 특히 리튬이나 디곡신, 항응고제, 경구용 당뇨병제, 이뇨제 또는 다른 진통제를 복용하고 있는 경우에는 의사와 상의한다.

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여

1)임산부 또는 수유부에 대한 안전성은 현재까지 알려진 자료로는 충분히 확립되어 있지 않으므로 임신 혹은 수유중인 경우에는 사용하지 않는 것이 좋다.

2)6세 이하의 소아에 대해서는 정해진 복용량이나 적응증이 설정되어 있지 않다.

8. 과량투여시의 처치

과량복용으로 인한 전형적인 증상은 알려져 있지 않으나 실수로 과량복용시에는 관찰되는 증상에 따라 처치하도록 해야 하며, 위장관자극, 저혈압, 호흡저하, 경련 등에 대비하도록 한다.

■포장단위 : 10, 100, 300정

■저장방법 및 사용기간

기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

만약 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드리겠습니다.

개정 : SD-2003-09-25

제조 및 판매원

SCD

삼천당제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 904-1

대표전화 : (02)2679-0146, http://www.scd.co.kr