

일반 의약품  
분류번호 239

위장관 운동조절제

# 마이부틴 정

( 말레인산트리메부틴 )

MYBUTIN Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

말레인산트리메부틴(식약청고시)-----100.0mg

■ 성 상

백색 내지 유백색의 원형 정제

■ 효능·효과

1. 주효능효과

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사), 동요자극, 수면장애

■ 용법·용량

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여합니다.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있습니다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지합니다.

■ 저장방법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

\* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

\* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서 작성일(2006년 8월 01일)이후 변경된 내용은  
당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)의 제품소개에서 제품명을 클릭하거나  
소비자 상담실(전화번호:080-611-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.



제조발매원

주식 동구제약  
회사

본사:서울특별시 구로구 고척2동 195-2  
공장:경기도 화성시 향남면 상신리 901-3  
www.dongkoo.co.kr