

프로엑스피액

PROXP Liquid

일반의약품
분류번호 : 329

성상	맑은 갈색의 액체
원료약품 및 분량	1병(20mL)중 자하거엑스(별규) 1.5mL 질산티아민(KP) 5.0mg 인산리보플라빈나트륨(KP) 6.85mg 염산피리독신(KP) 5.0mg 니코틴산아미드(KP) 20.0mg 무수카페인(KP) 30.0mg 안식향산나트륨(KP) 15.0mg
효능·효과	자양강장, 허약체질, 육체피로, 병후의 체력저하, 식욕부진, 영양장애, 발열성·소모성질환, 임신수유기일때의 영양보급
용법·용량	성인 1일 1회, 1회 1병 복용하십시오.
사용상의 주의사항	1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. → 구성성분에 과민증이 있는 환자 2. 다음 경우에는 투여하지 마십시오. → 임부, 수유부 3. 부작용 1) 이 약의 투여에 의한 구역, 구토, 묽은 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상, 과요산 혈증, 간 손상을 일으킬 수 있습니다. 3) 피리독신을 1일 50밀리그램~2그램의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상이 나타날 수 있습니다. 4. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오. 2) 일정기간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오. 3) 이 약은 안식향산나트륨을 포함하고 있으며, 안식향산은 피부, 눈 점막에 경미한 자극이 될 수 있습니다. 5. 임상검사치에의 복용 노의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀접하여) 보관하십시오. 3) 오염을 피하고 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
저장방법	기밀용기, 실온(1~30℃)보관
포장단위	자사포장단위

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 지점이나 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 "소비자피해보상규정"에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상하여 드립니다.

P0806-01



일왕약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
 소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
 학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr