젠빅® 연질캡슐

일반의약품

근육경련 및 혈액순환개선제

이 약을 복용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.

작 용 · 특 성: 비타민과 미네랄 성분은 소량으로도 체내의 여러 가지 화학반응에 관여하여 반응을 촉진시키고 세포의 기능을 활성화시켜 줍니다. 이 중 마그네슘은 탄수화물과 지방, 단백질 대사 또는 핵산을 합성·분해하는 효소활동에 꼭 필요한 성분으로서, 부족시 얼굴 근육이나 눈꺼풀이 떨리는 등의 근육경련 증상이 나타나게 됩니다. 특히 현대인들에게는 공해, 스트레스 등의 원인에 의해 근육, 혈관의 수축 및 경련 등의 증상이 나타나기 쉽습니다. 또한 나이가 들어감에 따라 어깨·목결림이나 손발저림 또는 손발시림 등과 같은 혈액순환장애 증상이 동반되는 경우가 많으므로 토코페롤과 같은 성분으로 이들 증상을 함께 개선시켜 주는 것이 중요합니다. **젠빅 연질캡슐**에는 근육경련증상을 개선시켜 주는 마그네슘 성분과 혈액순환을 원활히 해주는 비타민 E 성분(초산토코페롤)이 함유되어 있어 근육경련 증상 및 말초혈액순환장애를 개선시켜 줍니다.

조 성 · 성 상: **1. 원료약품의 분량 :** 1캡슐 중

초산토코페롤(KP) ····· 500mg
(비타민 E로서 500 IU)

산화마그네슘(KP) ····· 250mg
(마그네슘으로서 150.8mg)

2. 성상 : 회백색 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제입니다

효 능 · 효 과: **1. 다음 경우의 비타민 E의 보급**

- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다
  말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 :
  어깨·목결림, 수족저림·수족냉증

2. 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련

용 법 · 용 량: 18세 이상의 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용하십시오.

사 용 상 의 주 의 사 항: **1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.**

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 12개월 미만의 영아
3) 심한 증상의 신부전 환자
4) 임부

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 수유부
3) 심장·순환기계기능 장애 환자
4) 신장애 환자
5) 저단백혈증 환자

3. 이상반응

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 충혈되어 붉어짐, 홍반, 부전수축, 중추신경계 기능저하
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부기 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여하십시오.
3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오

5. 상호작용

1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 함께 투여하지 마십시오.
   - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3) 잘못된 사용·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[주의]

1) 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용이 되지 않도록 주의하십시오.
2) 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
3) 제품 개봉시 또는 취급시 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

저 장 방 법 : 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

포 장 단 위 : 젠빅 연질캡슐 ····· 60, 120 캡슐

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

® = 등록상표

I03 · 041803

종근당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080 (수신자 부담)

이 설명서 작성일자(2006. 9. 18)이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지 (www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.