투스딘골 캡슐

일반의약품

잇몸질환 치료제

작 용 · 특 성 : **투스딘골드 캡슐**은 잇몸질환의 원인균에 대해 직접적인 살균효과가 있으며 모세혈관의 저항성 증강 및 투과성 억제로 출혈증상을 없애줍니다.
투스딘골드 캡슐은 잇몸 조직의 혈액순환을 원활히 하므로써 손상된 잇몸에 수분을 공급하고 발적과 부종을 완화시킵니다. 또한 치조연골조직, 잇몸조직의 구성성분인 collagen의 생합성을 촉진하여 손상된 잇몸조직의 재생을 촉진하는 등 잇몸질환의 원인 및 증상들을 제거해 주므로 건강한 잇몸 유지에 필요한 잇몸질환 치료제입니다.

약 리 작 용 : 1. **투스딘골드 캡슐**은 모세혈관벽을 튼튼히 하여 잇몸출혈을 억제시키고 지혈을 촉진시킵니다.
2. **투스딘골드 캡슐**은 원인균에 직접 작용하여 염증을 분해시키므로 잇몸질환을 근본적으로 치료해 줍니다.
3. **투스딘골드 캡슐**은 잇몸의 혈액순환을 촉진시켜 발적 및 부종증상을 완화시킵니다.
4. **투스딘골드 캡슐**은 치조연골조직 및 구성성분인 collagen 합성을 촉진하므로 손상된 잇몸 조직을 재생시켜 줍니다.

조 성 · 성 상 : 1. **원료약품의 분량 :** 1캡슐 중

아스코르빈산(약전)	150.0mg
염화리소짐(식약청고시)	30.0mg(역가)
카르바조크롬(식약청고시)	2.0mg
초산토코페롤50%(식약청고시)	10.0mg
	(dl-α-초산토코페롤로서 5mg)

2. **성상 :** 엷은 주황색의 가루가 든 상하부 파란색의 경질캡슐

효 능 · 효 과 : 치은염 · 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적 · 부기 · 출혈 · 통증)의 완화

용 법 · 용 량 : 성인 1일 3회, 1회 1캡슐 식후에 복용하십시오.

사 용 상 의 주 의 사 항 : 1. **다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2. **부작용**
1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진 · 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3) 오용을 피하고, 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

저 장 방 법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

포 장 단 위 : 투스딘골드 캡슐 ····· 120, 240캡슐

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

I01 · 030303

종 근 당
본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)