

덴타민

캡슐

잇몸질환은 충치와 더불어 2대 치과질환 중의 하나로 연령이 증가함에 따라 발병률도 증가하는 것으로 알려져 있습니다.

덴타민캡슐은 잇몸질환을 일으키는 원인균에 대하여 살균 및 잇몸염증을 억제하는 염화리소짐과 잇몸의 모세혈관을 강화시키고 투과성을 저하시켜 잇몸출혈을 예방해 주는 카르바조크롬 그리고 손상된 잇몸조직의 재생을 도와주는 2종류의 비타민으로 처방되어, 잇몸질환의 원인 및 증상을 제거하는 치주질환 치료제입니다.

성상

얇은 주황색 가루가 든 상: 적갈색, 하: 담갈색의 경질캡슐제

성분·함량

1캡슐 중

염화리소짐(식약청고시 제98-127호) 30mg(역가)

카르바조크롬(식약청고시 제98-127호) 2mg

아스코르빈산(약전) 150mg

50% 초산토코페롤(식약청고시 제2003-47호) 10mg

(초산토코페롤로서 5mg)

효능·효과

치은염, 치조농루에 의한 여러증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증) 완화

용법·용량

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

사용상의
주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람

2. 부작용

1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는,

발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오염을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

포 장 단 위

10, 90, 120, 180, 240 캡슐

저 장 방 법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 "소비자피해보상규정"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

P0504-03



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr