

덴티린

캡슐

DENTIRYN Capsules

덴티린캡슐은 잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증 등 증상완화에 효과적인 제제입니다.

■ 원료약품 및 분량 : 1캡슐중

염화리소짐(식약청고시).....	30mg(역가)
아스코르빈산(약전).....	150mg
건조비타민 E 50%(별규).....	10mg
(dl- α -초산토크페롤로서 5mg)	
카르바조크롬(식약청고시).....	2mg
옥수수전분(약전).....	75mg

■ 성 상

얇은 주황색의 분말이 든 상·하부 청색의 경질캡슐제

■ 효능·효과

치은염, 치조농루에 의한 여러증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증)의 완화

■ 용법·용량

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 2) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람

2. 이상반응

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막만증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안출혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과 의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀정하여 보관하십시오.
- 3) 오염을 막고, 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ 저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서 작성일(2006년 07월 01일)이후 변경된 내용은

당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)의 제품소개에서 제품명을 클릭하거나

소비자 상담실(전화번호:080-611-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.

판매원



광동제약(주)

제조원



주식 동구제약
광기도 화성시 향남면 상인리 901-3