

이부에프정

(Ibuprofen + Arginine)

이부에프정은 비스테로이드성 소염·진통·해열제인 이부프로펜에 아르기닌을 첨가하여 용출율을 높인 제품으로서 아르기닌에 의해 위장관에서 이부프로펜의 흡수가 촉진되어 이부프로펜의 최고 혈중농도가 기존 이부프로펜 단일제에 비해 2배정도 높으며, 약효발현시간이 3배 이상 신속하므로 기존 이부프로펜 단일제제에 비해 보다 빠르고 강력한 약효를 나타냅니다.

또한 아르기닌 자체도 뇌의 진통 펩타이드인 메치오닌-엔케팔린 유리를 촉진하여, 더욱 상승된 진통효과를 보이며, 위점막 보호작용을 가짐으로써 위장 장애가 감소되어 안전성이 좋아졌습니다.

이부에프정은 류마티스성 관절염을 비롯한 관절질환의 장기요법 및 두통, 월경통, 감기 등 각과 영역의 염증성, 통증성 및 발열성 질환에 신속하고 강력한 약효를 나타내는 약물입니다.

【원료약품 및 분량 : 1정중】

이부프로펜 (약 전).....	200.0mg
아르기닌 (B. P).....	185.0mg

【성 상】 연분홍색의 장방형 필름 코팅정제

【효능·효과】

류마티양 관절염, 골관절염, 배통, 두통, 월경통, 외상후 소염·진통, 유행성 감기로 인한 발열 및 통증

【용법·용량】

성인 및 12세 이상의 소아 : 1회 1-2정을 4-6시간 마다 물과 함께 복용한다. 1일 최대 6정(1200mg)까지 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 소화성 궤양환자
 - 2) 심한 혈액이상 환자
 - 3) 기관지 천식, 아스피린 천식 또는 그 병력이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
 - 2) 신장애 또는 그 병력이 있는 환자
 - 3) 심기능 부전 환자
 - 4) 소화성 궤양 또는 그 병력이 있는 환자
- 부작용
 - 1) 소화기계 : 구역, 복부팽만감, 위통, 가슴앓이, 식욕부진, 설사, 변비, 구토, 위염, 잠재성 출혈과다 등의 증상이 나타날 수 있다. 또한 드물게 출혈을 동반한 소화기계의 궤양의 증상이 나타날 수 있다.
 - 2) 신경계 : 때때로 반응성의 억제와 같은 중추신경 부작용, 두통, 우울, 현기증, 불면, 공포, 의식장애 등의 증상이 나타날 수 있다. 또한 드물게 신경성 발작이 일어날 수 있다. 자가면역질환(전신성 홍반성 루푸스 증후군)환자에게 드물게 무균성 수막염이 유발될 수 있으므로 신중히 투여한다.
 - 3) 감각기계 : 때때로 이명, 난청, 약시등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 4) 과민증 : 드물게 두드러기, 자반, 가려움증, 발진이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지

한다.

- 5) 피부 : 드물게 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 6) 간장 : 드물게 황달, GOT, GPT, AL-P의 상승 등이 나타날 수 있다.
- 7) 혈액 : 드물게 재생 불량성 빈혈, 용혈성 빈혈, 자가면역 출혈성 빈혈, 출혈, 과립구 감소, 혈소판 감소, 혈소판 기능 저하(출혈시간 연장)등이 나타날 수 있으므로 혈액검사를 하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 있을 경우에는 즉시 투여를 중지한다.
- 8) 신장 : 드물게 급성 신부전을 일으킬 수 있으므로 핍뇨, 혈뇨 등의 증상 및 요단백, BUN, 혈중크레아티닌의 상승, 고칼륨혈증이 검사소견에서 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다. 전신부종등이 나타날 수 있다.

4. 상호작용

- 1) 경구용 항응혈제와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
- 2) 아스피린과 병용투여시 이 약 및 다른 비스테로이드성 소염진통제의 작용을 저하시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 3) 프로베네시드, 설핀피라존과 병용투여시 이 약이 프로베네시드, 설핀피라존의 이뇨작용을 약하게 하여 이 약의 배설을 지연시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 4) 이뇨제, 항고혈압제와 병용투여시 그 작용을 저하시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 5) 디곡신과 병용투여시 디곡신의 혈장 중 농도가 증가할 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 6) 페니토인과 병용투여시 페니토인의 혈장 중 농도가 증가할 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 7) 이 약은 혈장 리튬치를 증가시키고 청소율을 감소시키므로 리튬제제와 병용투여시 리튬의 독성에 주의한다.
- 8) 메토포레세이트와 병용투여시 그 혈액학적 독성을 증강시키므로 병용투여하지 않는다.
- 9) 바크로펜과 병용투여시 그 독성을 증강시키므로 병용투여하지 않는다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 모유로의 이행이 보고되어 있으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 경고

매일 세잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1-30℃)보관

【포 장 단 위】 자사포장단위

【사 용 기 간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준에 따라 엄격한 제조공정과 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ☎080-311-2222

※ 최신의 정보 확인 방법 : 이 첨부문서 작성일자(2003.2) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화(031)550-0474~8 (주)일화 학술·개발부를 통해 확인할 수 있음.

작성년월 : 2003. 2



경기도 구리시 수택동 437
<http://www.ilhwa.co.kr>