일반의약품
분류번호 : 222

생약성분의 안전한 진해거담제

아이비투

시럽

Ivytu syr.

500ml

【 특장점 】

1. 아이비투 시럽은 순수 생약성분의 진해거담제로 특별한 부작용이 없어 소아에게 안심하고 사용할 수 있으며, 약물상호작용이 없으므로 항생제 등과 병용투여가 가능합니다
2. 아이비투 시럽은 점액을 용해시켜 점성을 낮추므로 객담배출을 용이하게 합니다
3. 아이비투 시럽은 기침중추에 대해 억제적으로 작용하며 기관지 경련을 억제하므로 기침으로 인한 호흡곤란을 효과적으로 억제시킵니다
4. 아이비투 시럽은 감미제로 소르비톨을 사용하고 있으며 설탕을 함유하고 있지 않습니다

【 원료약품 및 분량 】 100ml 중

아이비엽70%에탄올유동엑스 (별규) 2g
(헤데라코시드C로서 40.0mg)
파라옥시안식향산메칠 (약전) 80mg
파라옥시안식향산프로필 (약전) 20mg

【 사용상의 주의사항 】

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
   1) 동성분에 과민증이 있는 환자
   2) 과당불내성 환자(소르비톨 성분 함유)
2. 부작용
   드물게 감미제로 사용된 소르비톨로 인하여 소화장애 및 설사가 일어날 수 있습니다.
3. 상호작용
   본 제제와 타 약제와의 병용투여시 현재까지 알려진 부작용은 없습니다.
4. 임부, 수유부에 대한 투여
   임부, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
5. 소아에 대한 투여
   2세 미만의 소아에 대한 투여는 의사의 지시에 따릅니다.
6. 저장상의 주의사항
   소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관합니다.

【 성상 】 오렌지의 향이 있는 갈색의 현탁시럽제

【 효능 · 효과 】

호흡기의 카다르, 만성 염증성 기관지 질환의 제증상 치료

【 용법 · 용량 】

연령	1일 복용횟수	1회 복용량
10세 이상, 성인	1일 3회	5ml
4~10세	1일 4회	2.5ml
1~4세	1일 3회	2.5ml
1세 이하	1일 2회	2.5ml

【 포장단위 】 80ml, 100ml, 500ml

【 저장방법 】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

「주의 – 부작용」

※생약제제이므로 침전이 간혹 생길 수 있으나 약효에는 변화가 없으므로 잘 흔들어 사용하십시오.
※의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 의원, 병원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.
※이 첨부문서 최초일자(2003년 11월 4일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.

문서최초일 : 2003년 11월 4일
소비자 상담실 (02)2041-8349
홈페이지 www.yungjin.co.kr

M42075①

제조번호 :

사용기한 :

제조발매원
영진약품공업주식회사
공장 : 경기도 화성시 무송동 470-5

원료공급원
extrakt chemie
Extrakt Chemie (Germany)

8 806010 549261