발열이 심한 인후염·편도염·기타염증에

인 후 콜캡슐

일반의약품	
분류번호	114

【약리작용】
인후콜은 은교산을 기본으로 한 생약제제로 각종 염증성 질환(발열이 심한 인후염, 편도염 기타 염증)에 잘 듣는 탁월한 해열, 진경, 진통제입니다.
목이 아픈감기, 각종두통, 기침등에 잘 듣는 순수 한방 청열 소염제 입니다.

【원료약품 및 분량】1캡슐 (600㎎)중

금은화 (약전)	710㎎
연 교 (약전)	710㎎
박 하 (약전)	426㎎
길 경 (약전)	426㎎
감 초 (약전)	426㎎
담죽엽 (생규)	284㎎
형 개 (약전)	284㎎
두 시 (생규)	356㎎
우방자 (생규)	356㎎
영양각 (생규)	22㎎
이상수침건조엑스	540㎎

【성 상】갈색의 분말 또는과립이 충전된 상 주황색·하 미황색의 경질 캡슐제
【효능·효과】두통, 감기로 인한 인후통, 입이 마르고 기침
【용법·용량】성인 1일 3회, 1회 2캡슐씩 식전 또는 식후 복용
【사 용 기 간】3년
【저 장 방 법】기밀용기, 실온(1-30℃)보관

【사용상의 주의사항】

1) 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
① 몸이 허약한 환자
② 위가 약한 환자
③ 혈압이 높은 환자
④ 심장이나 신장에 장애가 있는 환자
⑤ 부종이 있는 환자
⑥ 지금까지 약을 복용하면서 두드러기가 나거나, 피부가 붉어지거나 가려움증 등을 일으킨 일이 있는 환자.
⑦ 임신부나 임신가능성이 있는 환자.
⑧ 현재 의사의 치료를 받고 있는 환자.

2) 복용할 때는 다음 사항에 주의하십시오.
① 정해진 용법·용량을 지킬 것.
② 소아에게 복용시킬 때에는 보호자 지도 감독 하에 복용시킬 것.
③ 본 제품은 5세미만의 젖먹이 어린아이에게는 복용시키지 말 것.

3) 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항에 주의하십시오.
① 이 제품을 복용함으로서 두드러기가 나거나, 피부가 붉어지거나 가려움증, 오심, 식욕부진, 위부 불쾌감 등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담할 것.
② 본 제품을 복용함으로써 소변량이 줄어들거나, 안면이나 손발이 부어오르거나, 눈꺼풀이 무겁게 되거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 높아지거나, 두통 등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담할 것.
③ 수일간 복용하여도 증상이 호전되지 않을 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담할 것.
④ 장기간 계속하여 사용할 경우에는 의사나 약사와 상담할 것.

4) 보관 및 취급상의 주의사항
① 소아가 만질 수 없는 장소에 보관할 것.
② 직사광선을 피하고 되도록 습기가 없고 서늘한 장소에 보관할 것.
③ 남용하지 말고, 계속해서 품질을 유지할 수 있도록 별도의 용기에 옮겨서 보관하지 말 것.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

ILSHIM PHARM CO.,
대구광역시 달서구 월암동 967번지
☎ (053) 583-1580～1

문서번호 : 050107