소화불량•구토 치료제

일반의약품	
분류번호	239

一心 半夏瀉心湯 엑스과립

반 하 사 심 탕

【藥理作用】

반하사심탕은 동의보감 및 금궤요락에 수재된 처방으로 황금,황련 및 위를 따뜻하게 해 주는 백삼, 위내정수, 위산과다 등 수분의 정체를 제거해 주는 반하, 건강 등을 기본처방으로 한 제제로 가슴과 옆구리 부위가 답답하여 편안하지 않은 증세,가슴과 배사이의 기기,먹어서 위부가 갑갑하고 눌려서 아픈 증세,심하비경 및 위와 장에서 소리가 나며 항상 메스껍고 구역,구토 증세가 있는 사람에게 대표적으로 선택되어 지는 처방입니다.

【원료약품의 분량】 1포 (3.0g) 중

반 하 (약전)……1.67g
황 금 (약전)……1.00g
(바이칼린으로서 100.0mg)
건 강 (약전)……0.83g
인 삼 (약전)……1.00g
감 초 (약전)……1.00g
(글리시리진산으로서 20.0mg)
대 추 (약전)……1.00g
황 련 (약전)……0.33g
(베르베린【염화베르베린】으로서13.9mg)
이상수침건조엑스……0.91g

【성상】 갈색의 과립

【효능 및 효과】

오목가슴이 마치고, 때로는 구역, 구토가 있고 식욕이 부진하며, 복명이 있고 연변 또는 설사가 있는 사람의 다음 제증
: 급만성 위장카달, 발효성 설사, 소화불량, 위하수, 신경성 위염, 위약, 숙취, 트림,가슴쓰림, 구내염, 신경증

【용법 및 용량】 성인 1일 3회, 1회 1포 (3.0g)씩 식전 또는 식간 복용

【포장단위】 1포 (3.0g)X180, 500g

【사용기간】 3년

【저장방법】 기밀용기, 건조한 냉암소보관

【사용상의 주의

1. 글리시리진산으로서 1일 최대량 40mg이상 함유하는 제제는 장기 연용할 경우 저칼륨혈증,혈압상승,나트륨체액의 저류,부종,체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 주의하여 사용하십시오.
2. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오 : 신생아, 수유부, 임신부

※本劑는 生藥劑인바 건조한 곳에 보관하시고 유통 과정에서 변질된 제품이 있으면 교환 하여 드립니다.

一心製藥 04. 04. 19
대구광역시 달서구 월암동 967번지
전화 (053) 583-1580 전송 583-1582
E-mail : ilshimph@msn.com