

몸살감기약

아프렉신정

Afrexin Tab.



감기 몸살 · 근육통 · 동통

아프렉신정은 해열·진통작용이 있는 아세트아미노펜과 활성형비타민 B₁인 푸르셀티아민을 배합함으로써 해열진통작용 뿐만 아니라 신경통, 근육통, 관절통, 류마티스성 동통에 효과가 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】1정 중

아세트아미노펜(KP)	500mg
푸르셀티아민(KPC)	20mg

【성상】

백색 타원형의 정제

【효능·효과】

1. 주효능·효과 : 감기로 인한 발열 및 동통, 치통
2. 다음 질환에도 사용할 수 있습니다 : 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 관절통, 류마티스성 동통

【용법·용량】

성인 : 1일 3회, 1회 1~2정씩 복용합니다.
12세 이하 : 1일 3회, 1회 1정씩 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하지 마십시오.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상[예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등)]을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 간장에 환자
- 2) 신장에 환자

4. 이상반응

- 1) 혈액 : 드물게 혈소판감소, 과립구감소 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오. 또 청색증이 나타날 수 있습니다.
- 2) 과민증 : 과민증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 3) 위장 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 장기간 사용시 위장관에 대한 이상반응 특히 출혈, 궤양 및 천공이 나타날 수 있습니다.

5. 복용시 주의사항

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우
- 2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.

6. 일반적 주의

유사화합물 투여에 의해 간질성 신염, 혈액소 이상을 일으킬 수 있으므로 장기투여를 피하십시오.

7. 임부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 임신 말기의 랫트에 투여한 실험에서 태자의 동맥관 수축이 보고된 바 있습니다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.

9. 과량투여

간장, 신장, 심근의 과사가 일어날 수 있습니다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

10정

※사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※상기 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 이상반응이 나타날 수 있습니다.

※어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

※본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

개정년월일 : 2007년 1월 4일



청계제약(주)

경기도 화성시 양감면 대왕리 1106-4

소비자 상담실 : 02-554-2639

홈페이지 : www.chunggei.co.kr