

진경제 에스코판정

에스코판정은 염산디사이클로민(Dicyclanide)의 부교감 신경 차단작용 및 직접적인 평활근 이완작용과 염산파파베린(Papaverine)의 평활근 이완작용의 상승효과로 진경작용을 상승시킨 제제입니다. 함께 배합된 우르소데옥시콜린산의 이담작용과 ℓ -멘톨의 건위작용으로 위장관의 장애로 인한 복통, 위통, 속쓰림에 효과가 있습니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

염산디사이클로민(KP).....	5.0mg
염산파파베린(KP)	15.0mg
우르소데옥시콜린산(KP).....	5.0mg
ℓ -멘톨(KP)	5.0mg

[성상] 백색원형의 필름코팅정

[효능·효과]

위통, 복통, 산통, 위산과다, 속쓰림
(상기 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 이상반응이 나타날 수 있습니다.)

[용법·용량]

15세 이상 성인 : 1회 2정, 1일 2~3회
11세 이상 15세 미만 : 1회 1정, 1일 2~3회
8세 이상 11세 미만 : 1회 1정, 1일 2~3회 식후 또는 식전에 복용합니다.
(다만, 1일 2회 이상 복용시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용합니다.)

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자는 신중히 복용하십시오.
 - 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 심장에 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애 환자, 허약자 또는 고령자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 다른 약물을 복용하고 있는 환자
- 이상반응
 - 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 이 약을 복용함으로써 구갈, 변비의 증상이 나타날 수 있습니다. 또 두통, 안면홍조, 눈부심, 배뇨장애 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 소아가 복용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용하십시오.
 - 이 약을 복용함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
 - 소회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 소아의 복용
이 약은 7세 이하의 영·유아는 복용하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

[포장단위] 10정, 10정×50개

※본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

개정년월일 : 2007년 04월 13일



청계제약(주)

경기도 화성시 양감면 대당리 1106-4

소비자 상담실 : 02-554-2639

홈페이지 : www.chunggei.co.kr