

텐 다 나 캡슐

치주질환치료제

일반의약품
분류번호 : 231

텐다나 캡슐은 소염제인 염화리소짐, 항산화비타민인 아스코르빈산, 토코페롤 및 동물로르필린나트륨이 이상적으로 배합되어 치은염 및 치조농루에 의한 각종 증상에 효과적입니다.

[원료약품의 분량] 1 캡슐 중

염화리소짐 (식품의약품안전청고시) (닭난백추출)	30 mg (역가)
아스코르빈산 (약전)	150 mg
간조초산토코페롤50% (별규)	60 mg
(초산토코페롤로서 30 l. U.)	
동물로르필린나트륨 (식품의약품안전청고시)	20 mg
유당 (약전)	70 mg
옥수수전분 (약전)	90 mg
스테아린산마그네슘 (약전)	5 mg
탈크 (약전)	5 mg
실리콘디옥사이드 (엔.에프.)	10 mg

[성상] 회녹색의 분말이 든 상부 보라색, 하부 백색의 경질 캡슐제

[효능·효과] 치은염, 치조농루에 의한 여러 증상 (잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

[용법·용량] 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
- 2) 악이나 달걀에 의해 알레르기 증상 (발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

2. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막만증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상양의 수증 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
- 3) 이 약은 14세 이하의 소아에게 투여하지 않는다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고, 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해서 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 차광한 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

· 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 때에는 구입한 약국을 통하여 교환해드립니다.

제조·판매원
SUDO 수도약품공업주식회사

본사 · 공장: 경기도 화성시 향남읍 상신리 902-5
서울: 서울특별시 강남구 삼성동 169-10
(소비자상담실) 080-080-4211

TEN 2007.04.04-02