

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 보관하여 주십시오.

KGMP
적격업체

일반 의약품
분류번호: 239

위장관 운동조절제

포부틴정

(말레인산트리메부틴)

Pobutin Tab.

■ **원료약품의 분량** 1정중

말레인산트리메부틴(Trimebutine Maleate)(식약청고시) 150mg

■ **성상** 흰색의 원형 필름코팅정

■ **효능·효과**

1. 주효능 효과

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능 이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애

■ **용법·용량**

성인: 1회 1정, 1일 3회 식전에 경구투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 이상반응

- 1) 소화기계: 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
- 3) 정신신경계: 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장: 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.
- 5) 과민증: 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지합니다.

■ **저장방법** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ **사용기간** 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** 30, 300, 500, 1000정

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성연월일: 2003.12.10(이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사의 홈페이지(www.ukp.co.kr)나 개발부(전화: 02-489-3611, E-mail: union@ukp.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.)



생명과학을 선도하는 벤처기업

한국유니온제약(주)

UNION KOREA PHARM CO., LTD.

강원도 원주시 문막읍 반계리 5-9