

비노코프 정

Binocough Tab.

콧물, 코막힘, 재채기, 인후통
일반의약품 / 분류번호 : 114

【원료약품의 분량】 1정(649mg) 중

아세트아미노펜(약전).....500mg
염산슈도에페드린(B.P.).....30mg
말레인산클로르페니라민(약전).....2mg
· 유당 <기원 : 소 사용 : 우유>

【성 상】 미황색의 장방형 필름코팅정

【효능 · 효과】

감기의 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법 · 용량】

성인 및 12세 이상의 어린이 :
매 6시간 마다 2정 복용, 최대 하루 8정을 초과할 수 없다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.

3. 다음 사람은 복용 전에 의사 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 의심되는 영·유아 및 어린이(14세 이하)
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
- 7) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법, 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것.
진해거담약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.
- 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
- 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이



디에스앤지 주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 907번지
<http://www.dspharma.co.kr>

나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

(1) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우.

(2) 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우.

(3) 천식이 나타난 경우.

6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간 독성을 증가시킬 수 있다.

5. 복용중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕 부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.

3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

4) 장기 연용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준 (KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 설명서의 작성일(2005년 10월 24일) 이후 변경된 내용은 디에스앤지 홈페이지나 개발부 02)3486-6451로 문의하시기 바랍니다.

※ 설명서 수정일 : 2005년 10월 24일