

테조신정 2mg

혈압강화 및 배뇨장애

Tezosin tab. 2mg

(염산테라조신)

전문 의약품

분류번호 : 214

**【원료약품 및 분량】** 이 약 1정 중  
염산테라조신 (염규) ----- 2.374mg  
(테라조신으로서 2mg)  
황색5호

**【성상】**  
오렌지색의 원형 정제

**【효능·효과】**  
- 고혈압(경증-중등도)  
- 양성전립선비대에 의한 배뇨장애

**【용법·용량】**  
이 약은 다른 약물이 부적절하거나 비효과적일 경우 단독 또는 치아깃제 이노제 및 다른 혈압강화제와 병용요법으로 투여할 수 있다. 유식물은 이 약의 생체내이용율에 거의 또는 전혀 영향을 미치지 않으므로 식사와 관계없이 투여할 수 있다. 용량은 환자의 혈압반응에 따라 조절한다.

- (성인)
- 초회량  
테라조신으로서 초회량으로 취침전 1mg을 경구투여하며, 이 용량을 초과해서는 안된다. 초회투여로 인한 급성 저혈압 발현 가능성을 최소화하기 위하여 초회 투여의 복용상태를 신중히 관찰한다.
  - 유지량
    - 고혈압
      - 단독투여 : 유지량으로 1일 1회 2-10mg을 투여하며 아침 또는 저녁에 복용하되 계속해서 같은 시간에 투여하는 것이 바람직하다. 바람직한 혈압반응을 얻기 위해 1주 간격으로 용량을 2배로 증량할 수 있다. 20mg 이상의 용량을 투여해도 더 큰 효과를 나타내지는 않으며 40mg 이상의 용량 투여에 관한 연구는 실시된 바 없다.
      - 치아깃제 이노제 및 다른 혈압강화제와 병용투여 : 치아깃제 이노제 또는 다른 혈압강화제와 병용투여하는 경우에는 이 약의 용량을 감량하며 필요한 경우 증량한다. 이러한 병용요법시 저혈압이 나타날 수 있으므로 신중히 관찰한다.
    - 양성전립선비대에 의한 배뇨장애  
이 약으로서 증상이 개선될 때까지 천천히 증량한다. 유지량으로 1일 1회 5-10mg을 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

**【사용상의 주의사항】**

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
  - 이 약 또는  $\alpha$ -차단제에 과민증의 병력이 있는 환자
  - 12세 이하의 소아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
  - 중증의 간·신기능장애 환자
  - 다음 질환으로 진단받거나 이러한 질환의 병력이 있는 환자  
: 기립성 저혈압, 기절발작, 의식상실, 심근경색, 뇌혈관장애, 일과성 허혈발작, 협심증, 위궤양, 당뇨병성 족부 질환, 기타 간질환, III·IV급 고혈압성 망막증, 인슐린 의존성 당뇨병
- 이상반응  
일반적으로 이 약 투여와 관련된 이상반응은 경증 내지 중등도이다.
  - 다른  $\alpha$ -차단제와 마찬가지로 이 약은 심신을 일으킬 수 있다(임상시험률: 약 1%). 때때로 심신은 심박수 120-160회/분의 빈맥의 발작이 전체가 되는 경우도 있으나 대개의 경우 과도한 기립성 저혈압에 의한 것으로 생각된다. 초회량 투여 후 30-90분에 심신이 나타난 예가 있으며, 때때로 급하게 증량할 경우에 나타난 예가 있다. 심신이면 환자를 앙와위로 한 후 필요하면 보조요법을 실시한다. 이러한 이상반응은 자기제어적이어서 대개의 경우 초회투여 후 또는 그 이후 증량 도중에는 재발하지 않는다.
  - 이 약을 40mg까지 과량투여 받은 환자에서 일반적으로 어지러움, 에너지결핍, 탈초성 부종이 나타났다. 대부분 이 이상반응은 지속적인 요법으로 소실되거나 감량하지 않고도 내약되었다.
  - 정신신경계 : 우울, 신경과민, 때때로 어지러움, 두통, 권태감, 무력감, 발한, 불면, 냉감, 어깨 결림, 드물게 졸음, 구갈, 마비감 등이 나타날 수 있다.
  - 순환기계 : 빈맥, 혈관확장, 때때로 기립성 조절장애, 심계항진, 부종, 부정맥(기의수축, 심방세동 등), 흉통, 드물게 협심증, 빈맥 등이 나타날 수 있다.
  - 간장 : 때때로 AST·ALT·ALP·총빌리루빈 상승이 나타날 수 있다.
  - 소화기계 : 소화불량, 복부팽만감, 배탈, 때때로 복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 드물게 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
  - 호흡기계 : 코피, 인플루엔자 증상(flu symptom), 인두염, 비염, 호흡곤란, 감기증상, 비축혈, 기침증가, 부비강염 등이 나타날 수 있다.
  - 비뇨기계 : 때때로 빈뇨, 드물게 요실금(배정기 이후의 여성), BUN, CPK상승 등이 나타날 수 있다.
  - 감각기계 : 감각이상, 균형장애, 시각장애, 약시, 결막염, 이명 등이 나타날 수 있다.
  - 피부 : 수분저류, 드물게 부종 등이 나타날 수 있다.
  - 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
  - 기타 : 체중증가, 강직, 관절종창, 관절염악, 근육통, 성욕감퇴, 발한, 팔기부전, 움직임지속발기, 혈소판감소, 때때로 흉분감, 코막힘, 습관한검, 눈의 위화감, 가려움 등이 나타날 수 있다. 또한 때때로 항응고제(ANA)양성이 나타날 수 있다.
- 시판후 경험 : 드물게 이 약의 투여 후 아나필락시스를 포함한 알러지 반응이 관찰되었다. 시판후 조사 동안 지속발기증, 저혈소판증, 심방세동이 보고되었다. 또한 배내장 수술시  $\alpha_1$ -차단제 투여와 관련하여 '수술 중 홍채이완 증후군'으로 알려져 있는 작은 동맥 증후군의 빈번이 보고되었다.

- 일반적 주의
  - 이 약의 초회투여 또는 투약누락 후 요법개개와 관련하여 어지러움, 가벼운 두통감, 기립성 조절장애, 심계항진, 두통, 졸음이 나타날 수 있으므로 환자에게 이러한 이상반응 및 그것이 발생할 수 있는 상황에 관해 주의시킨다.
  - 투여초기 또는 용량을 증감하는 경우에 혈압강화작용에 의한 어지러움, 기립성 조절장애 등이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

- 누운 자세나 앉은 자세로부터 빨리 일어설 때 어지러움, 가벼운 두통감, 기립이 나타날 수 있으므로 환자에게 그 가능성에 관해 주의시키고 이러한 증상이 나타나면 누운 다음 재발을 막기 위해 일어시기 전에 수분간 앉아 있도록 지시한다.
- 이 약은 전립선비대에 의한 배뇨장애의 대증요법이므로 이 약의 투여에 의해 효과가 나타나지 않는 경우에는 수술 등 다른 적절한 처치를 한다.
- 양성 전립선 비대증과 전립선암은 유사한 증상을 나타내고 함께 발생하기 쉬우므로 이 약으로 양성 전립선 비대증을 치료하기 전에 전립선암의 발생 여부를 확인해야 한다.
- $\alpha_1$ -차단제를 복용하고 있거나 이전에 복용했던 일부 환자에서 배내장 수술을 하는 동안 '수술 중 홍채이완증후군(Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS)'이 관찰되었다. 따라서 안과적 수술시 홍채 후(iris hook), 홍채 확장 고리(iris dilator ring) 또는 점탄성물질(viscoelastic substance) 등 주로 사용하는 수술방법에 있어서 가능한 수술 방법의 변화를 준비해야 한다.
- 상호작용
  - 다음 약물과 뚜렷한 상호작용 없이 투여되고 있다.
    - 전립선요제(아세트아미노펜, 아스피린, 인도메타신, 이부프로펜, 페닐부타존, 텍스트로프로폭시펜, 톨레펜)
    - 강심배당체(다곡산)
    - 혈당강화제(글루코프루미드, 인슐린, 볼라자미드, 볼부타미드)
    - 부정맥용제(프로카인아미드)
    - 항콜린약, 진정제(클로라제페이트, 클로르다이제폭시드, 디아제팜, 플루라제팜)
    - 통풍약(알로푸리놀, 프로베네시드)
    - 항생물질(암피실린, 에리스로마이신, 페니실린, 테트라사이클린, 트리메토프림, 설파메복사졸)
    - 호르몬, 스테로이드제제(에스트로겐제제)
    - 항소스타민제(클로르페니라민)
    - 심혈관약물(아테놀올, 히드로클로로티아지드, 메틸클로로티아지드, 프로프라놀롤)
    - 항콜린성교감신경효능약(페닐에프린, 페닐프로판올아민, 히드로클로라이드, 슈도에페드린)
    - 위장관약(제산제)
  - 혈당강화제와 병용투여하는 경우에는 혈압강화작용이 증가될 수 있다.
  - 배라파롤과 병용투여하는 경우에는 상호작용이 증가될 수 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
  - 동물실험에서 기형발생이 나타나지 않았으나 사람에게 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
  - 동물실험(랫)에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이 한 경우에는 수유를 중단한다.
- 소아에 대한 투여  
소아에 대한 안전성 및 효용성이 확립되지 않았다(사용경험이 없다.).
- 고령자에 대한 투여  
일반적으로 고령자에서의 과도한 혈압강화는 바람직하지 않으므로(뇌경색 등이 나타날 수 있다.) 저용량(1회 0.25mg 1일 2회)에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
- 임상검사에서의 영향  
이 약을 장기간 투여하여도 다음의 실험실적 검사지에는 임상적으로 유의성 있는 변화가 없었다.  
: 포도당, 요산, 크레아티닌, 요소, 간기능검사, 전해질, 혈액학적 검사지
- 과량투여시의 처치  
이 약의 투여로 급성 저혈압이 나타날 경우에는 실험관계 보조요법이 가장 중요하다. 환자를 앙와위로 누워 혈압이 회복되고 심박수가 정상화될 수 있다. 만일 이러한 처치가 부적절할 경우에는 우선 체액증량제로 속을 치료한 후 필요하면 혈관수축제를 투여할 수 있다. 신기능을 검사하고 필요에 따라 일반적인 보조요법을 실시한다. 이 약은 단백결합력이 높으므로 투석은 효과가 없다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
  - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
  - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것
- 기타
  - 수컷 랫트에게 고용량으로 장기 투여시 종양이 생성되었으나 마우스를 대상으로 한 유사한 시험에서는 이러한 증상이 없었다. 사람에게 대한 이러한 증상과의 관련성은 알려지지 않았다.
  - 유사화합물(염산프라조신)에서 신장 부위의 동맥혈액, 다리부위의 동맥류 등의 혈관장애가 있는 고혈압 환자에서 급성 열성 다발성 관절염이 나타났다는 보고가 있다.

의약품을 사용하기 전에 사용지에서는 설명서를 주의있게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

- ※ 저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월
- ※ 포장단위 : 30정, 500정
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 제품문의처 : 02-3485-0405 / 02-3485-0419
- ※ 설명서 최종개정연월일 : 2007.09.07
- ※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.kolmarpharm.co.kr](http://www.kolmarpharm.co.kr))의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.