

이연 염산파파베린 주사

【원료약품 및 분량】 1mL 중

주성분 : 파파베린염산염(KP)..... 30mg
첨가제(안정제) : 에데트산나트륨수화물(KP)..... 0.05mg

【성상】 무색의 투명한 액이 든 앰플제

【효능·효과】

1. 다음 질환에서의 내장평활근의 경련 : 위염, 담석증
2. 말초순환장애, 급성 동맥색전, 급성 폐색전

【용법·용량】

성인 : 파파베린염산염으로서 1회 30~50mg, 1일 100~200mg을 피하주사한다.
급성동맥색전에는 1회 50mg을 동맥내 주사, 급성 폐색전에는 1회 50mg을 정맥주사한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상 주의사항】

1. 경고
앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될수 있도록 신중하게 절단사용 하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
2) 방실블록 환자(전도가 억제될 때 심실근원의 일과성 이소성 리듬, 조기박동 또는 발작성 빈맥을 일으킬 수 있다.)
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
녹내장 환자(안압상승에 의해 녹내장이 악화될 수 있다.)
4. 부작용
1) 호흡기계 : 호흡억제가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
호흡깊이의 증가가 나타날 수 있다.
2) 간 장 : 드물게 간과민증(황달, 호산구증다증, 간기능검사변화 등)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
3) 정신신경계 : 어지러움, 졸음, 두통, 과도한 진정, 무력감, 권태감 등이 나타날 수 있다.
4) 소화기계 : 변비, 구갈, 심와부통, 식욕부진, 구역, 드물게 설사, 복부불쾌감 등이 나타날 수 있다.
5) 과민증 : 피부발진, 안면홍조 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
6) 순환기계 : 혈압상승, 심계항진, 때때로 부정맥 등이 나타날 수 있다.
7) 기 타 : 안면홍조, 발한 등이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
이 약 투여시 약물 또는 외과수술 중재가 필요한 음경지속 발기가 보고되어 있으므로 발기불능에는 이 약을 사용하지 않는다.
6. 상호작용
레보도파와 병용투여시 레보도파의 작용이 저하될 수 있으므로 주의한다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다)
2) 모유중으로의 이행이 알려진 바 없으나 많은 약물이 모유중으로 이행되므로 수유중에는 신중히 투여한다.
8. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다)
9. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
10. 적용상의 주의
1) 정맥주사하는 경우에는 급속한 투여로 인한 호흡정지를 방지하기 위해 될 수 있는 한 천천히 투여한다.
2) 앰플을 절단할 때는 유리의 미소면이 혼입되는 것을 피하기 위하여 앰플에 줄칼로 금을 넣은 후 알콜솜으로 씻어내고 절단한다.
3) 이 약은 침전을 생성하므로 젯산링겔주사액에 첨가하지 않는다.
4) X-선 조영제인 이옥사글린산(Ioxaglic acid)과 혼합하면 침전이 생성될 수 있으므로 병용하는 경우에는 따로따로 사용하거나 또는 카테터 내를 생리식염액으로 씻어내는 등 직접 혼합하지 않도록 주의한다.
11. 기타
정맥주사에 의해 사망에 보고되어있다.

【포장단위】 1앰플(1mL) × 자사포장단위

【저장방법】 차광, 밀봉용기, 실온보관 (1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 1월 2일)이후 변경된 내용은 www.reyonpharm.co.kr이나 ezdrug.kfda.go.kr에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명이나 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조
- ※ 고객센터 : 080-221-2000(수신자부담)

작성년월일 : 2009. 1. 2

제조발매원
이연 제약주식회사
본사:서울·용산구 동빙고동 38-6
공장:충북 진천군 덕산면 한천리 27-27
TEL. (02)793-5557,5374