KUKJE PHARMA IND. CO., LTD.

※ 2002년 7월 1일 이후부터 제조물 책임법이 시행되고 있습니다.
의사나 약사께서는 부작용을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다음사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 환자에게 투약하기 전 반드시 설명서를 주의깊게 읽고 필요한 사항은 환자에게 복약지도 합니다..
2. 용법, 용량을 확인하고 투약하십시오.
3. 습기와 열원을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
4. 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
5. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
※ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

〔전문의약품〕

New Generation Expectorant

엘펙트 캡슐

(에르도스테인)

엘펙트캡슐은 에르도스테인 300mg 제제로 pro-drug형태의 새로운 거담제입니다. 엘펙트캡슐은 점액 생성 및 점도를 조절하고, 호흡기 점막 섬모운동을 촉진시켜 객담 배출을 용이하게 합니다. 또한 항생제와 병용 투여 시에 호흡기 염증 및 객담 부위로 항생제 침투를 증가시키는 작용이 있어 각종 감염성 호흡기 질환치료에도 유용한 약제입니다.엘펙트캡슐은 위에서는 불활성상태이며, 혈중으로 흡수된 후 3가지 대사물로 변화하여 약리작용을 나타내기 때문에 다른 cysteine 제제가 가지고 있는 위장관 부작용을 거의 나타내지 않는 내약성이 우수한 거담제입니다.

【성분 · 함량】 이 약 1캡슐(388mg) 중
에르도스테인(별규) ····· 300mg

【성상】
백색의 분말이 들어있는 상부 초록색, 하부 미황색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】
급만성 호흡기 질환에서의 점액용해 및 거담

【용법 · 용량】
1일 2~3회, 1회 1캡슐씩 복용

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
   1) 동성분에 과민증이 있는 환자
   2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소 (cystathionine synthase) 결핍환자

2. 이상반응
   1) 사용량(1200mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조흉이 나타납니다.
   2) 국내 시판후 조사결과(조사증례수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않습니다.
   : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결절성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 몽롱함, 발진

3. 상호작용
항생제, 기관지확장제(테오필린, β2-효능약, 기침완화제(cough sedative)등)와 병용할 수 있습니다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여
임신중, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
   2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
【사용기간】 36개월
【포장단위】 100, 300 캡슐

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 복용하십시오.
※ 유효기한 · 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자를 통하여 본사 영업부(TEL. 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부(TEL. 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
※ http://www.kukjepharm.co.kr

가장 좋은 약은 사랑입니다.

제조발매원
국제약품공업주식회사
경기도 안산시 단원구 초지동 648번지

작성일 : 2004년 6월 1일