

아세클라 정 (아세클로페낙)

【원료약품의 분량】 1정 중
아세클로페낙(KP) 100mg

【성 상】
백색의 원형 필름코팅정제

【효능 · 효과】
· 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 회음 외측 절개 수술 후, 분만 후, 비관절성 류마티즘
으로 인한 통증
· 류마티양 관절염, 강직성 척추염, 골관절염 및 건갑상완골의 관절 주위염

【용법 · 용량】
통상 성인의 경우 1회 1정씩, 1일 2회(12시간마다) 복용합니다. 단, 의사나 약사의 지시에 따라 복
용량과 횟수를 조절 할 수 있습니다. 반드시 정제를 씹어 먹지 않도록 합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
매일 세잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우
반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이약을 복용하면 위장출혈이 유발될
수 있습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 본 제제 또는 같은 계열의 일부약물(디클로페낙)에 대해 알레르기 증상이 있는 환자
 - 2) 다른 비스테로이드성 소염제와 마찬가지로, 아세틸살리실산 및 기타 -로스타클란딘 합성효소
저해작용을 갖는 약물에 의해 천식 위험의 증가, 담마진 또는 급성 비염을 일으킬 수 있는
천식환자.
 - 3) 활동성 위십이지장 궤양이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 위장관의 질병이나 과거의 위궤양 경험이 있는 환자
 - 2) 심한 간경련, 심장 또는 신장의 병변을 가진 환자
 - 3) 이뇨제를 복용중인 환자
 - 4) 외과적 처치 후에 회복기에 있는 환자
 - 5) 고령자
4. 이상반응
일시적으로 경미한 위복부통증, 구토, 오심, 위부포만감 등이 나타나며 때로 발진, 발적, 담마진,
야뇨현상의 증가를 비롯하여 두통, 현기증, 졸음 또는 피로가 나타날 수 있습니다.
5. 일반적 주의
현기증 혹은 기타 중추신경계의 장애를 느끼는 환자의 경우는 운전을 하거나 어떤 위험한 기계
를 다루는 일도 해서는 안되며 특별한 주의를 요하는 환경을 피합니다.
6. 상호작용
다른약물과의 상호작용은 아직까지 알려진바 없으나 환자가 다른 약들 특히 리튬이나 digoxin,
항응고제, 경구용 당뇨병제, 이뇨제 또는 다른 진통제를 복용하고 있는 경우에는 의사와 상의
하도록 합니다.

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여

- 1) 임신부 또는 수유부에 대한 안전성은 현재까지 알려진 자료로는 충분히 확립되어 있지 않으므로 임신 혹은 수유중인 경우에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 2) 6세 이하의 소아에 대해서는 정해진 복용량이나 적응증이 설정되어 있지 않습니다.

8. 과량투여시의 처치

과량복용으로 인한 전형적인 증상은 알려져 있지 않으나, 실수로 과량복용시에는 관찰되는 증상
에 따라 처치하도록 해야하며 위장관자극, 저혈압, 호흡저하, 경련 등에 대비하도록 합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 500T, 1000T

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의 깊게 읽으시고 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 이 약은 의사 또는 치과 의사의 처방에 의하여 복용(사용)할 수 있는 전문의약품입니다. 이 약의 올바른 복용(사용)법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
- ※ 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.kmspharm.com>)에서 확인할 수 있습니다.

작성년월 : 2006.01



개량신약기술로 앞서가는기업

KMS 제약(주)

경기도 수원시 영통구 매탄3동 492-1
TEL(031)215-5456 FAX(031)215-5925
www.kmspharm.com