

에페리젠 정

전문의약품

분류번호:122

(에페리손염산염)

Eperigen Tab.

【원료약품 및 분량】 1정 중

에페리손염산염(KP) 50mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 원유에서 유래)

【성 상】 흰색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 근골격계 질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완종후군, 견관절주위염, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질한

【용법·용량】

성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여 하십시오. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자 2) 중증의 근무력증 환자 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있습니다.)

3. 부작용

- 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
- 3) 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
- 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
- 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있습니다.
- 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있습니다.
- 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있습니다.
- 8) 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있습니다.
- 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신관태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있습니다.
- 10) 기타 : 때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지하십시오.
- 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.

5. 상호작용

이 약의 유사약품인 염산테페리손과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단하십시오.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

【포장 단위】 300정, 30정

【저장 방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

개정년월일 : 2016. 01. 20

※본 의약품은 우수의약품제조관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부(Tel : 02-580-5900(대))로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지(www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되며, 의약품용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.

*사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오. *첨부문서를 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



생명공학 제약기업

(주)뉴젠팜

전라북도 익산시 석암로 9길 117

우수의약품제조관리기준
KGMP 조차지정업체