

위 · 장관 경련 치료제

타 이 론 정

(염산티로프라미드)

타이론정은 중추성 부작용 발생의 위험이 높은 항콜린제나 칼슘이온의 유입을 완전히 차단하는 기존의 진경제와는 달리, 근이완 작용을 하는 CAMP의 생성을 촉진시키며 칼슘이온의 유입을 조절하는 진보된 약리작용을 가지는 근친화성 장관운동 정상화제로서 각종 평활근 경련에 신속하고 탁월한 진경효과를 나타냅니다.

■원료약품의 분량 1정 중

염산티로프라미드(별규) 100mg

■성 상

백색의 원형 필름코팅정

■효능 · 효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 :
간담도 산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장 · 요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 :
위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

■용법 · 용량

성인 : 염산티로프라미드로서 1회 100mg 1일 2-3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
2) 거대 결장, 허탈 환자
3) 이 약에 과민증 환자
4) 중증의 간부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지할 것.
4. 상호작용
혈압강화약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압 상승효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 임부나 태아에 대한 부작용을 나타내지는 않았으나 임부예의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여할 것.

■저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■포장단위 300, 500정

본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시
사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자 : 2004. 8. 17(이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사의 홈페이지(www.ukp.co.kr)
나 전화(02-489-3611)로 확인할 수 있습니다.)



한국유니온제약(주)
UNION KOREA PHARM CO., LTD.
강원도 원주시 문막읍 반계리 5-9