

급·만성 호흡기질환 거담제

전문의약품

엔디스 캡슐

Erdosteine

(에르도스테인)

Endis Cap.

분류번호: 222

엔디스캡슐은 점액을 신속히 분해하여 담을 묽게하고, 객담의 배출을 쉽게 하여 우수한 거담 효과를 발휘합니다. 엔디스캡슐은 기관지와 폐에만 집중적으로 작용하면서 호흡을 원활하게 해주는 효과 빠른 거담제입니다.

■ 원료약품의 분량 (1캡슐 중)

에르도스테인(별규) ----- 300mg

■ 성상

백색의 분말이 들어있는 상부 초록색, 하부 미황색의 경질캡슐제

■ 효능·효과

급·만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

■ 용법·용량

1일 2~3회, 1회 1캡슐씩 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

1) 동성분에 과민증이 있는 환자

2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자

2. 이상반응

1) 사용량(1200mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조혼이 나타났다.

2) 국내 시판후 조사결과(조사증례수 : 캡슐제3,303명, 시럽제791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결절성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 몽롱함, 발진

3. 상호작용

항생제, 기관지확장제(테오필린, β_2 -효능약, 기침완화제(cough sedative)등)와 병용할 수 있다.

4. 임부·수유부에 대한 투여

임신중, 수유부예의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

■ 포장단위 : 10, 30, 300캡슐

■ 저장방법 및 사용기간

기밀용기, 실온보관(1~30°C), 제조일로부터 36개월

만약 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드리겠습니다.

개정 : SD-2006-12-15

* 이 첨부문서 작성일자(2006년 12월 15일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.scd.co.kr)의 '제품안전성정보'에서 확인하실 수 있습니다.



제조 및 판매원

삼천당제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 904-1

대표전화 : (02)2679-0146, <http://www.scd.co.kr>