

엘도텍캡슐

(에르도스테인)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐중
에르도스테인(별규)300mg

【성상】
흰색 분말이 들어있는 상, 하부 연녹색의 경질캡슐제

【효능·효과】
급만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

【용법·용량】
1일 2-3회, 1회 1캡슐씩 복용

- 【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것
 - 1) 동성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자
 2. 이상반응
 - 1) 사용량(1200mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조홍이 나타났다.
 - 2) 국내 시판후 조사결과(조사증례수 : 캡슐제3,303명, 시럽제791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결절성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 몽롱함, 발진
 3. 상호작용
항생제, 기관지확장제(테오필린, β_2 -효능약, 기침완화제(cough sedative 등)와 병용할 수 있다.
 4. 임부·수유부에 대한 투여
임신중, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 5. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 · 사용기간: 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

첨부분서 작성일: 2006. 8



한국웰니스제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4

소비자상담실: 031)494-5995

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는
오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부분서 작성일 이후 변경된 내용은 소비자 상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.