

세팔로스포린계 항생제

유니클러[®] 캡슐

(Uniclor Cap.)

유니클러캡슐은 β -lactamase와 산에 대한 안정성을 높여 치료효과와 흡수율을 동시에 개선시킨 2세대 세팔로스포린계 항생제로서 폐렴구균, 인플루엔자균, 대장균, 포도구균, 화농성 연쇄구균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라, 임균 등에 광범위한 항균 스펙트럼을 가지고 있습니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

세파클러(항기) 250mg(역가)

【성 상】 미황색의 분말의 내용물이 든 상부 자색, 하부 백색의 캡슐제

【효능·효과】

- 유효균종
폐렴구균, 인플루엔자균, 포도구균, 화농성연쇄구균, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라속, 임균
- 적응증
1. 주 효능 효과
중이염, 폐렴, 인후두염, 편도염, 기관지염, 신우신염, 방광염, 임균성 요도염, 부스럼, 옹종, 모낭염, 봉소염, 감염성 죽종, 피하농양, 표저, 창상감염

【용법·용량】

- 성인 : 세파클러로서 1회 250mg(역가)을 8시간마다 경구 투여한다.
중증감염증(폐렴 등)과 감수성이 낮은 감염증의 경우 2배로 증량 투여할 수 있다.
- 어린이 : 1일 체중 kg당 20mg(역가)을 8시간마다 분할 투여한다.
중증감염증, 중이염 및 감수성이 낮은 균에 의한 감염의 경우에는 1일 체중 kg당 40mg(역가) 투여할 수 있으며 최대용량은 1일 1g(역가)이다.
- 신기능 손상 환자 : 용량 변화 없이 투여할 수 있다. 베타 용혈성 연쇄구균감염의 치료는 적어도 10일간 투여해야 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 의하여 속의 병력이 있는 환자
 - 2) 세팔로스포린계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 이 약 또는 세렙계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
 - 2) 페니실린계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 3) 본인 또는 부모, 형제가 기관지 천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
 - 4) 심한 신장장애 환자
 - 5) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)
3. 부작용
 - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 과민증 : 아나필락시양 증상(전신홍조, 부종, 호흡곤란), 발진, 두드러기, 홍반, 가려움증, 발열, 림프절종창, 관절통, 혈청병양반응 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 3) 피부 : 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군), 리엘증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 4) 혈액 : 때때로 무과립구, 과립구감소 또한 드물게 범혈구감소, 빈혈, 혈소판감소, 호산구증가, 림프구증가, 백혈구감소, 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈, 가역적 호중구감소 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

- 5) 간장 : 드물게 황달, 때때로 GOT, GPT, AL-P의 상승이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 6) 신장 : 드물게 급성 신부전증의 심한 신장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 7) 소화기 : 드물게 위막성대장염 등의 혈변을 수반하는 심한 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 또한 때때로 구역, 구토, 설사, 복통, 위부불쾌감, 가슴쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
- 8) 호흡기 : 다른 세렘계 항생물질 투여시 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, PIE증후군 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여 등 적절한 처치를 한다.
- 9) 중추신경계 : 드물게 가역적인 기능항진, 신경과민, 불면, 착란, 현기, 환각, 졸음 등이 나타날 수 있다.
- 10) 균교대증 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다.
- 11) 비타민결핍증 : 드물게 비타민 K결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있다.
- 12) 과량투여 : 구역, 구토, 상복부 불쾌감 및 설사가 나타날 수 있으며 상복부 불쾌감과 설사의 정도는 용량과 관련이 있다. 처치는 여러 약물의 과량투여, 약물상호작용 및 비정상적인 약물동력학 등이 고려되어야 한다. 정상용량의 5배가 투여되었을 때는 위장관 세척, 활성탄 투여가 필요하며, 이때 기도를 보호해야 한다. 환자의 활력증상, 혈액가스, 혈청내 전해질 등을 관찰해야 한다.
- 13) 기타 : 드물게 복통, 현기, 생식기 가려움증, 질염 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여한다.
- 2) 속 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진한다.

5. 상호작용

- 1) 경구용 항응혈제와 병용 투여시 드물게 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 2) 이 약의 신배설이 프로베네시드에 의해 억제될 수 있으므로 신중히 투여한다.

6. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

7. 수유부에 대한 투여

모유로의 소량 이행이 보고되어 있으므로 수유부에는 신중히 투여한다.

8. 신생아에 대한 투여

1개월 이하의 신생아에 대한 유효성 및 안전성은 확립되어 있지 않다.

9. 임상검사치에 대한 영향

- 1) 테스테이프 반응을 제외한 베네딕트시약, 펄링시약, 클리니테스트에 의한 여당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 2) 직접 쿼츠시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【유효기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

※ 본 의약품은 KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리 기준)에 의하여 제조된 제품입니다.
만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염·손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해드립니다.

※ 본 첨부문서의 변경된 최신내용은 당사 소비자상담실 또는 홈페이지에서 확인 하실 수 있습니다.

의약품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

설명서 개정년월일 2007년 9월 5일

제조·판매원



주| 비씨월드제약

서울시 강남구 포이동 184-8번지 경빌딩
공장: 경기도 여주군 가남면 삼군리 11
소비자상담실: (02)2182-0434
www.bcwp.co.kr