정부공인 KGMP
우수의약품 적격업체제품

전문의약품
분류번호 : 114

NSAIDs의 새로운 Pro-drug
텔리펜정
[Talniflumate 370mg]

텔리펜정은 그동안 NSAIDs에서 가장 문제가 되었던 위장관 부작용(GI Trouble) 및 흡수개선을 목적으로 개발된 Pro-Drug으로, 내약성이 뛰어나고 부작용 발현 또한 현저하게 낮아 관절염 등의 외과영역 외에도 산부인과, 이비인후과 등 모든 과에 광범위하게 처방가능한 제제입니다.

■원료약품의 분량 1정 중
탈니플루메이트(식약청고시) ····· 370mg

■성상 황색의 원형 필름코팅정

■효능 · 효과
다음 질환에 사용할 수 있습니다.
- 류마티스양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 좌골신경통, 무월경성 동통, 외상 후 동통, 수술 후 염증 및 동통, 건초염, 염좌, 자궁부속기염, 인두염, 편도염, 이염, 부비동염

■용법 · 용량
성인 : 탈니플루메이트로서 1회 370mg(1정)을 1일 3회 경구 투여합니다.
중증일 경우에는 1회 740mg(2정)을 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■사용상의 주의사항
1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우, 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상을 유발할 수 있습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 소화성궤양 또는 그 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 간장애 환자
2) 신장애 환자

4. 부작용

1) 과민증 : 일반적으로 내성이 좋으나 과민증 환자는 구역, 구토가 일어날 수 있습니다.

2) 소화기 : 장기 투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 천공이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의하십시오.

2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.

① 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 하십시오.

② 약물요법 이외의 치료법도 고려하십시오.

3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.

① 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여하십시오.

② 원칙적으로 동일한 약품의 장기 투여는 피하십시오.

③ 원인요법이 있으면 그것을 실시하십시오.

4) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의하십시오.

5) 감염증을 불현성화 할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여하십시오.

6) 다른 소염진통제와 병용 투여는 피하는 것이 바람직합니다.

7) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의하십시오.

6. 상호작용

쿠마린계 항응혈제(와르파린 등)와 병용투여 시 그 작용을 증가시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여하십시오.

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여

1) 임부, 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

2) 어린이 용량은 설정되어 있지 않으므로 12세 이하 어린이에게는 투여하지 마십시오.

■**포장단위** 500T

■**저장방법** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 이 첨부문서 작성일자 (2004년 8월)이후 변경된 내용은 홈페이지 (www. jrpharm.co.kr) - 제품소개나 개발팀(TEL : 02-3019-8532~3)을 통해서 확인하실 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 본사마케팅팀(02-521-1814) 또는 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

소비자상담전화 : 02-3019-8532~3 (개발부)

0804

약효로 인정받는 미래도전기업

JRP (주)제이알팜

경기도 화성시 향남면 상신리 900-2