전문의약품/분류번호 : 114

KGMP 적격업체제품

비스테로이드성 소염 · 진통제

타리마겐정

(탈니플루메이트)

NSAIDs의 사용시 가장 큰 문제점으로 지적되는 위장자극은 활성물질의 esterification에 의한 prodrug(활성전구약물)화에 의해 효과적으로 감소된다는 사실이 밝혀짐에 따라, ester형태는 소염진통제의 새로운 요건으로 간주되고 있습니다.
타리마겐정(Talniflumate)은 niflumic acid의 phthalidyl ester로서 위장관에서 불활성체로 흡수되고 염증부위에서 혈중 esterase에 의해 활성체로 변화되어 약효를 나타내는 제제로서, 위장점막에 자극을 제거하고 위장장해를 최소화한 제제입니다.
타리마겐정은 indomethacin, phenylbutazone, aspirin 보다 강력한 항염작용을 나타내며, 신속하고 우수한 치료효과로 통증, 염증 등의 증상을 효과적으로 치료하여 줍니다.
타리마겐정은 내약성이 우수하여 장기투약시, 만성질환 환자 및 노인환자에게도 안전하게 사용할 수 있으며, 신장기능에 전혀 영향을 미치지 않으므로 신장장애 환자에게도 무리 없이 사용할 수 있는 안전한 제제입니다.

【원료약품 및 분량 : 1정중】

탈니플루메이트(식약청고시)·····370mg

【성　　상】 황색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

1. 다음 질환에 사용할 수 있다.
   류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 좌골신경통, 무월경성 동통, 외상후 동통, 수술후 염증 및 동통, 건초염, 염좌, 자궁부속기염, 인두염, 편도염, 이염, 부비동염

【용법 · 용량】

성인 : 탈니플루메이트로서 1회 370mg을 1일 3회 경구투여한다.
중증일 경우에는 1회 740mg을 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1)이 약에 과민증 환자
   2)소화성 궤양 또는 그 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1)간장애 환자
   2)신장애 환자
4. 부작용
   1)과민증 : 일반적으로 내성이 좋으나 과민증 환자는 구역, 구토가 일어날 수 있다.
   2)소화기 : 장기 투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 천공이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
   1)소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.
   2)만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
   ① 장기 투여하는 경우 정기적인 임상검사(뇨검사, 혈액검사, 간기능 검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다.
   ② 약물요법이외의 치료법도 고려한다.
   3)급성 질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
   ① 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
   ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.
   ③ 원인요법이 있으면 그것을 실시한다.
   4)환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의한다.
   5)감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.
   6)다른 소염진통제와 병용투여는 피하는 것이 바람직하다.
   7)고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의한다.
6. 상호작용
   쿠마린계 항응혈제(와르파린 등)와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여
   1) 임부, 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
   2) 어린이 용량은 설정되어 있지 않으므로 12세 이하의 어린이에는 투여하지 않는다.
8. 적용상의 주의
   본 제제는 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의할 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ♣080-311-2222

※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 작성일자(2004년 10월)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr)또는 전화 (031)550-0474-8 (주)일화/학술 · 개발부를 통해 확인할 수 있음

작성년월일 : 2004년 10월

ILHWA Ph.
경기도 구리시 수택동 437
http://www.ilhwa.co.kr