진해거담제 〈전문의약품〉

에르도스® 캡슐

(에르도스테인)

Brand of Erdose 분류번호 : 222

【원료약품 및 그 분량】

1캡슐 중

에르도스테인(별규) ····· 300.0mg

【성 상】

백색의 분말이 들어있는 상부 녹색, 하부 미색의 경질캡슐제

【효능·효과】

급만성 호흡기 질환에서의 점액용해 및 거담

【용법·용량】

1일 2~3회, 1회 1캡슐씩 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   1) 동성분에 과민증이 있는 환자
   2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성요소(cystathionine synthase) 결핍환자
2. 이상반응

   여기서 '드물게'는 0.1%미만을, '때때로'는 0.1-5%미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5%이상 또는 빈도불명을 의미함
   1) 사용량(1200mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조흥이 나타났다.
   2) 국내 시판후 조사결과(조사증례수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결절성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 몽롱함, 발진
3. 상호작용

   항생제, 기관지확장제(테오필린, β_2-효능약, 기침완화제(cough sedative)등)와 병용할 수 있다.
4. 임부·수유부에 대한 투여

   임신중, 수유부에 대한 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
5. 보관 및 취급상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
   2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

[저장방법]

기밀용기, 실온보관

[포장단위]

100, 500 캡슐

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

〈설명서작성년월:04. 9〉

〈M01〉

제조·판매원

명문제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 901-1

www.mmpharm.co.kr