

위장 기능 정상화제

한올 말레인산트리메부틴 정

HAN ALL Trimebutine maleate Tab.

한올말레인산트리메부틴정은 과도로 항진되거나 억제된 위·장운동을 정상화하므로 기능적 소화불량시에 나타나는 식전 항진, 식후 저하되는 연동운동의 개선에 적절하고, 과민성 대장염 등의 기능적 결장 질환시에 교대로 나타나는 변비와 설사의 치료에 매우 효과적인 제품입니다.

■ **성상** 백색의 원형 정제

■ **원료약품 및 그 분량** 이 약 1정 중,
말레인산트리메부틴(식약청고시) 100mg

■ **효능·효과**

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애

■ **용법·용량**

성인 : 말레인산 트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 복용하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ **사용상의 주의사항**

1. 이상반응

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내 마비감 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여하는 수유를 중지하십시오.

■ **저장방법** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **사용기한** 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ **포장단위** 10정, 30정, 100정, 500정

■ **제조·판매원** 한올제약주식회사

※ 본 의약품은 KGMP업소에서 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시, 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최신허가변경사항은 자사의 홈페이지 www.hanall.co.kr 에서 확인바랍니다.

TMB-I-2
07-10-10

HANALL 
pharmaceutical

한올제약 | 주

서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-SPACE B/D 6F / 공 장 : 대전광역시 대덕구 상서동 400-1

고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr