

아시코정 200mg
(아시클로버)

전문 의약품

분류번호:629

Acyclo tab. 200mg

【원료약품 및 분량】 이 약 1정 중
아시클로버(USP)-----200mg
청색 2호

【성상】
연청색의 원형정제

【효능·효과】
1. 초발성 및 재발성 생식기 포진을 포함한 피부 및 점막조직의 단순포진 바이러스 감염증의 치료 및 예방
2. 대상포진 감염증의 치료, 특히 급성기의 통증에 효과가 있다. 반면 포진후 신경통에 대한 효과는 아직 증명되지 않았음.
3. 2세 이상 소아의 수두치료

【용법·용량】
(성인)
1. 단순 포진 바이러스 감염증의 치료
1) 1일 5회, 1회 1정(아시클로버로서 200mg)씩 취침시간을 제외하고 약 4시간 간격으로 복용한다.
2) 투여는 5일간 계속하며 중증 초발성 감염증의 경우는 치료를 연장해야 한다.
3) 중증 면역기능 저하환자(골수이식후 등)또는 소화관 흡수장애 환자에는 1회 2정(아시클로버로서400mg)까지 증량하거나 정주요법으로 바꿀 수 있다.
4) 투여는 감염후 빠를수록 좋으며, 재발성인 경우 전구증상이나 병변이 처음 나타날 때 투여하는 것이 좋다.
2. 면역기능이 정상인 환자의 단순포진 감염증의 예방
1) 1일 4회, 1회 1정(아시클로버로서 200mg)씩 약 6시간 간격으로 복용한다.
2) 1일 2회, 1회 2정(아시클로버로서400mg)씩 12시간 간격으로 복용할 수도 있다.
3) 용량 추정은 1회 1정(아시클로버로서 200mg)을 1일 2-3회 투여해 봄으로써 유효성을 더 정확히 알아낼 수 있다.
4) 장기치료 환자에게 계속적 억제기능의 유무를 재평가하기 위해서는 매 6-12개월 간격으로 주기적으로 치료를 중단해야 한다.
3. 면역기능이 저하된 환자의 단순포진 감염증의 예방
1) 1일 4회, 1회 1정(아시클로버로서200mg)씩 약 6시간 간격으로 복용해야 한다.
2) 중증 면역기능 저하환자(골수이식 후 등)또는 소화기관 흡수장애 환자에는 1회 2정(아시클로버로서400mg)까지 증량하거나 정주요법으로 바꿀 수 있다.
3) 감염위험 기간 동안 투여한다.
4. 대상포진 감염증의 치료
1) 1일 5회, 1회 4정(아시클로버로서800mg)씩 취침시간을 제외하고 약 4시간 간격으로 복용하며, 투여는 7일간 계속한다.
2) 중증면역기능 저하환자 또는 소화관으로부터 흡수가 잘안되는 환자의 경우 정맥주사가 좋다.
3) 투여는 감염후 빠를수록 좋으며 발적이 나타난 후 빨리 치료하면 할수록 더 좋은 효과가 나타난다.

(소아)
1. 단순포진 감염증의 치료 및 면역기능이 저하된 환자의 단순포진 감염증의 예방
1) 2세 이상 : 성인에 준함.
2) 2세 미만 : 성인용량의 1/2을 투여함.
2. 면역기능 정상환자의 단순포진 바이러스 감염증의 예방에 대한 확실한 자료는 아직 없다.
3. 2세이상 소아의 수두치료
1회 체중 kg당 아시클로버로서 20mg(800mg을 초과하지 않도록)씩 1일 4회, 5일간 투여한다. 치료는 수두발진이 나타난 후 빠를수록 좋으며 가급적 발진 후 24시간 이내에 투여한다.

(신장기능 장애환자)
1. 단순포진 감염증의 치료
1)경구적으로 권장할 수 있는 용량은 정맥주사 때의 혈중농도 보다 더 높지 않는 것이 좋다.
2)그러나 심한 신장기능 손상환자(크레아티닌 클리어런스치가 10mL/분 미만인 자)에는 12시간마다 1정(아시클로버로서 200mg)씩 투여하는 것이 좋다.
2. 대상포진 감염증의 치료
심한신장기능 손상환자(크레아티닌 클리어런스치가 10mL/분 미만인자)의 경우 1회 4정(아시클로버로서 800mg) 1일 3-4회, 약 6-8시간 간격으로 투여하는 것이 좋다.

(노인)
1. 노인의 경우 총 아시클로버 클리어런스치가 크레아티닌 클리어런스치와 더불어 감소하기 때문에 아시클로버를 많이 복용한 노인환자에 있어서는 적절한 수분을 공급해 주어야 한다.
2. 신장장애가 있는 노인환자에 있어서 용량감소에 대해서는 특별한 주의를 해야 한다.

【사용상 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 이 약에 과민증의 전력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 신기능 장애환자
2) 소아
3. 부작용
1) 정신신경계 : 드물게 졸음, 현운이 나타날 수 있다.
2) 신장 : 때때로 BUN상승 및 뇨침전물중에 적혈구가 나타날 수 있다.
3) 혈액 : 때때로 백혈구 감소 또는 증가, 호산구증다등이 나타날 수 있다.
4) 간장 : 간기능 검사치의 이상(때때로 GOT, GPT, LDH, AL-P, 총빌리루빈치상승)이 나타날 수 있다.
5) 소화기 : 때때로 설사, 심와부통, 위통, 구역, 구토등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여중지하는 등 적절한 처치를 할 것.
6) 피부 : 때때로 발진, 수포, 두드러기양홍반, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여중지하는 등 적절한 처치를 할 것.
7) 전신증상 : 때때로 전신권태감, 드물게 두통이 나타날 수 있다.
8) 골격근 : 관절통이 나타날 수 있다.
9) 기타 : 때때로 총콜레스테롤치, 트리글리세라이드치, 혈청칼륨치의 상승, 동계가 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
1) 단순포진의 치료에 있어서, 5일간 사용하여, 개선의 조짐이 보이지 않거나, 악화되는 경우에는 다른 치료로 바꿀 것.
2) 발병초기에 가까울수록 효과가 기대되므로 초기에 투여개시하는 것이 바람직하다.
5. 상호작용
1) 프로베네시드는 아시클로버의 혈장농도 곡선에서 아시클로버의 평균 반감기 및 면적을 증가시킨다.
2) 신장기능에 영향을 주는 어떤 약물도 아시클로버의 약물동력학에 실질적 영향을 줄 수 있다.

6. 임부에 대한 투여 : 동물실험에서 최기형성작용이 보고되었기 때문에 임부 또는 임신 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 사용할 것.

* 저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 25℃이하 건조보관, 제조일로부터 36개월

* 포장단위: 30정, 100정

* 제품문의처: 02)3485-0405

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 설명서 최종 개정연월일: 2007.06.28

* 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.kolmarpharm.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

제조의뢰자:  **한국콜마**

충남 연기군 전의면 신정리 618-3

제조사: **대원제약(주)**

경기도 화성시 향남면 상신리 903-1