



3가지 약리작용의 중추성 근육이완제

한울염산에페리손 정

(Eperisone HCl 50mg)

한울염산에페리손정은 척수의 γ -motor nerve에 작용하여 과도한 근육 악화를 초래하지 않고 최적의 근육이완 효과를 나타냅니다. 한울염산에페리손정은 근육이완작용 뿐만 아니라, 혈류개선 및 동통반사 억제작용의 3가지 약리작용으로 각종 근긴장 상태와 경견마비에 뛰어난 효과를 나타냅니다. 또한, 진정·수면 작용이 거의 없을 뿐만 아니라, 위장관 장애도 극히 미약한 안전한 근육 이완제입니다.

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1정 중,

염산에페리손 (별규) 50mg

■ 성 상

백색의 원형 당의정제

■ 효능·효과

1. 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축: 경견완중후군, 견관절주위염, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비: 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상 후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질한

■ 용법·용량

성인 : 염산에페리손으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절한 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 중증의 근무력증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있습니다.)

3. 이상반응

- 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 2) 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
- 3) 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
- 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
- 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있습니다.
- 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 시지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있습니다.
- 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있습니다.
- 8) 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요살금, 잔뇨감이 나타날 수 있습니다.
- 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신관태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있습니다.
- 10) 기타 : 때때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 투여 중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지합니다.
- 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.

5. 상호작용

이 약의 유사약물인 염산톨페리손과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단합니다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

■ 저장방법 · 사용기한

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

■ 포장단위 10, 30, 100, 500정

■ 제조 · 판매원 한울제약주식회사

- ※ 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 최신 허가 변경 사항은 자사의 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다.

EPR-I-2
07-04-11

HANALL 
pharmaceutical

서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-SPACE B/D 6F
공 장 : 대전광역시 대덕구 상서동 400-1
고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr