일반의약품

코감기·초기감기에
새로운 성분 더욱 안전해진

콜민®-A 시럽
Colmin-A Syrup

콜민-A 시럽은 항히스타민제와 비충혈제거제를 효과적으로 배합시켜 코감기, 초기감기 치료에 탁월한 효과를 나타내는 딸기향의 맛이 좋은 시럽제입니다.

<원료 약품의 분량> 이 약 100ml 중
- 말레인산클로르페니라민(약전) ·····40mg
- 염산페닐레프린(약전) ·····100mg
- 안식향산나트륨(약전) ·····100mg

<성 상>
- 딸기향을 가지는 담적색의 단맛이 있는 시럽제

<효능·효과>
- 감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염에 의한 다음 증상의 완화
  (재채기, 콧물, 코막힘, 눈물)
- 부비동염에 의한 비충혈의 일시적 완화

<용법·용량>
- 성인(만 12세 이상): 4시간마다 10ml, 1일 최대 60ml
  혹은 의사의 지시에 따름.
- 만 6~12세 소아 : 4시간마다 5ml, 1일 최대 30ml
  혹은 의사의 지시에 따름.
- 만 6세이하 소아: 의사의 지시에 따름.

<사용상의 주의사항>

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   (1) 아민계 교감신경항진제, 항히스타민제, 기타 이 약의 성분에 과민성인 환자.
   (2) 특이체질 환자.
   (3) 수유부.
   (4) 중증의 고혈압 환자, 중증의 관상동맥질환 환자, MAO 저해제 치료를 받고 있는 환자.
   (5) 협우각성 녹내장, 뇨저류, 소화성궤양, 천식, 폐기종, 만성폐질환, 숨이 차거나, 호흡곤란이 있는 환자.
   (6) 진정제, 신경안정제를 투여 받고 있는 환자.

2. 다음 경우에는 신중히 투여하십시오.

만성 기관지염 등의 호흡곤란, 심질환, 고혈압, 갑상선기능질환, 당뇨병, 녹내장, 전립선 비대로 인한 배뇨곤란을 가진 환자는 의사의 지시가 없는 한 복용하지 마십시오.

3. 부작용

(1)교감신경아민을 포함한 약제는 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다.
:공포, 불안, 긴장, 진전, 쇠약, 창백, 호흡곤란, 배뇨곤란, 불면, 환각, 경련, 중추신경 억제, 부정맥, 어지러움, 저혈압을 동반한 심혈관 허탈.

(2)페닐레프린에 과민인 사람은 빈맥, 동계, 두통, 어지러움, 오심등의 에페드린양 반응이 나타날 수 있습니다. 그러나 페닐레프린은 적량 투여시는 이런 부작용이 나타나지 않는 안전한 약물입니다.

(3)항히스타민제에 과민인 사람은 중등도의 진정작용을 나타낼 수 있습니다.

(4)항히스타민제로 인한 다른 부작용은 구갈, 어지러움, 쇠약, 식욕부진, 오심, 구토, 두통, 신경과민, 다뇨증, 가슴앓이, 복시, 배뇨곤란 등이 있고 드물게 피부염이 나타날 수도 있습니다.

(5)졸음을 일으킬수 있으며, 알코올, 진정제, 신경안정제 등이 졸음을 증가 시킬수 있습니다.

(6)어린이에게는 특히 흥분이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적주의

(1)7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 의사와 상의하십시오.

(2)이 약의 복용중에는 알코올성 음료를 피하십시오.

(3)이 약의 복용중 자동차 운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의하십시오.

(4)용량을 초과하지 않도록 하고, 사고로 과량 복용시에는 의사와 상의하십시오.

(5)이 약의 복용에 의해 어지러움, 불면, 신경과민 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사와 상의하십시오.

(6)이 약은 안식향산나트륨을 포함하고 있으며 안식향산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있습니다.

5. 보관 및 취급상의 주의

어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

<포장단위> 1병(10ml, 80ml, 100ml, 500ml)×자사포장단위
<저장방법> 기밀용기, 실온보관(1-30℃)
<사용기간> 제조일로부터 36개월

※ 의사, 약사의 지시에 따라 복용하십시오.
※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

「소비자상담실 (02)3408-8349」
「홈페이지 www.yungjin.co.kr」

043001

제조발매원
영진약품공업주식회사
본사 : 서울 · 성동구 성수 2가 3동 277-58
공장 : 전라북도 익산시 용제동 598-1