M38915ⓞ

양성 전립선비대증 치료제

탐로신 서방정

염산탐스로신 0.2mg

「전문의약품」
분류번호 : 259

[원료약품의 분량] 이 약 1정 중
염산탐스로신(별규) ····· 0.2mg

[성상]
흰색의 원형 정제입니다.

[효능, 효과]
양성 전립선비대증에 따른 배뇨장애

[용법・용량]
통상 성인은 염산탐스로신 0.2mg을 1일 1회 식후에 경구투여합니다.
단, 연령 · 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게 투여하지 마십시오.
   1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
   2) 신기능 장애 환자

2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
   기립성 저혈압이 있는 환자

3. 부작용
   1) 실신, 의식상실(빈도불명) : 혈압저하에 동반하는 일과성의 의식상실 등이 나타나는 일이 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
   2) 정신신경계 : 때때로 어지러움, 균형감각의 이상이 나타날 수 있습니다.
   3) 순환기계 : 때때로 빈맥이 나타날 수 있습니다.
   4) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있기 때문에 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지해야 합니다.
   5) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 위부불쾌감, 위중감, 위통, 식욕부진이 나타날 수 있습니다.
   6) 간장 : ALT, AST의 상승, 황달 등이 나타나는 경우가 있으므로, 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 이 약 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
   7) 기타 : 때때로 연하장애, 인두부 작열감, 전신권태감이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의
   1) 이 약을 과량투여할 경우 혈압저하가 예상되므로 투여량에 주의해야 합니다.
   2) 신기능 장애가 있는 환자에게 투여시 혈장중 농도의 과도한 상승이 나타날 수 있는데, 이 경우의 약물동태는 충분히 규명되어 있지 않으므로 신기능 장애 환자에게는 이 약을 투여하지 않습니다.
   3) 선자세(立位)의 혈압이 저하될 수 있으므로 체위변환에 따른 혈압변화에 주의하여야 합니다.
   4) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의하여 이 약 투여로 기대되는 효과를 얻지 못할 경우에는 수술요법 등 다른 적절한 조치를 고려해야 합니다.
   5) 어지러움 등이 나타날 수 있으므로 높은 곳에서의 작업이나 자동차 운전 등 위험이 따르는 작업에 종사하는 경우에는 주의를 환기시켜야 합니다.
   6) 이 약을 투여하기 전에 혈압강하제의 복용여부를 확인하여야 하며, 혈압강하제를 복용한 경우에는 혈압변화에 주의하고, 혈압저하가 나타날 경우에는 감량 또는 투여 중단 등 적절한 처치를 하여야 합니다.
   7) 동물시험에서 단백결합 투여시 항원성을 나타내는 것으로 보고되어 있습니다.

5. 고령자에 대한 투여

고령자중에는 신기능이 저하된 환자가 있으므로 이러한 경우에는 0.1mg부터 투여하여 경과를 충분히 관찰한 후 0.2mg으로 증량합니다. 0.2mg으로 기대되는 효과를 얻지 못할 경우에는 더 이상 증량하여 투여하지 말고 다른 적절한 처치를 하여야 합니다.

6. 복용상의 주의

이 약을 씹어서 복용하지 않도록 환자에게 주의시키십시오.

[포장단위]

자사 포장단위 (외부포장 표기참조)

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간]

제조일로부터 24개월

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 최초일자(2004년 8월 25일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.

소비자 상담실 : (02) 2041-8349

홈페이지 www.yungjin.co.kr

문서 최초일 : 2004년 8월 25일

제조발매원

영진약품공업주식회사

공장 : 경기도 화성시 무송동 470-5