

200mg

# 아 나 시 정

(아시클로버)

## 【원료약품의 분량】 1정 중

아시클로버(USP) ..... 200mg

## 【성 상】 연청색의 원형 정제

## 【효능·효과】

1. 초발성 및 재발성 생식기 포진을 포함한 피부 및 점막조직의 단순포진 바이러스 감염증의 치료 및 예방
2. 대상포진 감염증의 치료, 특히 급성시의 통증에 효과가 있다. 반면 포진후 신경통에 대한 효과는 아직 증명되지 않았음.
3. 2세 이상 소아의 수두치료

## 【용법·용량】

(성인)

1. 단순 포진 바이러스 감염증의 치료
  - 1) 1일 5회, 1회 아시클로버로서 200mg씩 취침시간을 제외하고 약 4시간 간격으로 복용한다.
  - 2) 투여는 5일간 계속하며 중증 초발성 감염증의 경우, 치료를 연장해야 한다.
  - 3) 중증 면역기능 저하환자(골수이식 후 등) 또는 소화관 흡수장애 환자에는 1회 아시클로버로서 400mg 까지 증량하거나 정주요법으로 바꿀 수 있다.
  - 4) 투여는 감염후 빠를수록 좋으며, 재발성인 경우 전구증상이나 병변이 처음 나타날 때 투여하는 것이 좋다.
2. 면역기능이 정상인 환자의 단순포진 감염증의 예방
  - 1) 1일 4회, 1회 아시클로버로서 200mg씩 약 6시간 간격으로 복용한다.
  - 2) 1일 2회, 1회 아시클로버로서 400mg씩 12시간 간격으로 복용할 수도 있다.
  - 3) 용량 추정은 1회 아시클로버로서 200mg을 1일 2~3회 투여해 봄으로써 유효성을 더 정확히 알아낼 수 있다.
  - 4) 장기치료 환자에게 계속적 억제기능의 유무를 재평가하기 위해서는 매 6~12개월 간격으로 주기적으로 치료를 중단해야 한다.
3. 면역기능이 저하된 환자의 단순포진 감염증의 예방
  - 1) 1일 4회, 1회 아시클로버로서 200mg씩 약 6시간 간격으로 복용해야 한다.
  - 2) 중증 면역기능 저하환자(골수이식 후 등) 또는 소화기관 흡수장애 환자에는 1회 아시클로버로서 400mg 까지 증량하거나 정주요법으로 바꿀 수 있다.
  - 3) 감염위험 기간 동안 투여한다.
4. 대상포진 감염증의 치료
  - 1) 1일 5회, 1회 아시클로버로서 800mg씩 취침시간을 제외하고 약 4시간 간격으로 복용하며, 투여는 7일간 계속한다.
  - 2) 중증면역기능 저하환자 또는 소화관으로부터 흡수가 잘안되는 환자의 경우 정맥 주사가 좋다.
  - 3) 투여는 감염후 빠를수록 좋으며 발적이 나타난 후 빨리 치료하면 할수록 더 좋은 효과가 나타난다.

(소아)

1. 단순포진 감염증의 치료 및 면역기능이 저하된 환자의 단순포진 감염증의 예방
  - 1) 2세 이상 : 성인에 준함.
  - 2) 2세 미만 : 성인용량의 1/2을 투여함.
2. 면역기능 정상환자의 단순포진 바이러스 감염증의 예방에 대한 확실한 자료는 아직 없다.
3. 2세이상 소아의 수두치료 1회 체중 kg당 아시클로버로서 20mg(800mg을 초과하지 않도록)씩 1일 4회, 5일간 투여한다. 치료는 수두발진이 나타난 후 빠를수록 좋으며 가급적 발진 후 24시간 이내에 투여한다.

(신장기능 장애환자)

1. 단순포진 감염증의 치료
  - 1) 경구적으로 권장할 수 있는 용량은 정맥주사 때의 혈중농도 보다 더 높지 않는 것이 좋다.
  - 2) 그러나 심한 신장기능 손상환자(크레아티닌 클리어런스치가 10mL/분 미만인 자)에는 12시간마다 아시클로버로서 200mg씩 투여하는 것이 좋다.
2. 대상포진 감염증의 치료
 심한신장기능 손상환자(크레아티닌 클리어런스치가 10mL/분 미만인 자)의 경우 1회 아시클로버로서 800mg 1일 3~4회, 약 6~8시간 간격으로 투여하는 것이 좋다.

(노인)

1. 노인의 경우 총 아시클로버 클리어런스치가 크레아티닌 클리어런스치와 더불어 감소하기 때문에 아시클로버를 많이 복용한 노인환자에 있어서는 적절한 수분을 공급해 주어야 한다.
2. 신장장애가 있는 노인환자에 있어서 용량감소에 대해서는 특별한 주의를 해야 한다.

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것  
이 약에 과민증의 전력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
  - 1) 신기능 장애환자
  - 2) 소아
3. 부작용
  - 1) 정신신경계 : 드물게 졸음, 현운이 나타날 수 있다.
  - 2) 신 장 : 때때로 BUN상승 및 뇨침전물중에 적혈구가 나타날 수 있다.
  - 3) 혈 액 : 때때로 백혈구 감소 또는 증가, 호산구증다등이 나타날 수 있다.
  - 4) 간 장 : 간기능 검사치의 이상(때때로 GOT, GPT, LDH, AL-P, 총빌리루빈치상승)이 나타날 수 있다.

- 5) 소화기 : 때때로 설사, 심와부통, 위통, 구역, 구토등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여중지하는 등 적절한 처치를 할 것.
- 6) 피 부 : 때때로 발진, 수포, 두드러기양홍반, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여중지하는 등 적절한 처치를 할 것.
- 7) 전신증상 : 때때로 전신권태감, 드물게 두통이 나타날 수 있다.
- 8) 골격근 : 관절통이 나타날 수 있다.
- 9) 기 타 : 때때로 총콜레스테롤치, 트리글리세라이드치, 혈청칼륨치의 상승, 동맥이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
  - 1) 단순포진의 치료에 있어서, 5일간 사용하여, 개선의 조짐이 보이지 않거나, 악화되는 경우에는 다른 치료로 바꿀 것.
  - 2) 발병초기에 가까울수록 효과가 기대되므로 초기에 투여개시하는 것이 바람직하다.
5. 상호작용
  - 1) 프로베네시드는 아시클로버의 혈장농도 곡선에서 아시클로버의 평균 반감기 및 면적을 증가시킨다.
  - 2) 신장기능에 영향을 주는 어떤 약물도 아시클로버의 약물동력학에 실질적 영향을 줄 수 있다.
6. 임부에 대한 투여 : 동물실험에서 최기형성작용이 보고되었기 때문에 임부 또는 임신 가능성이 있는 부인에는 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 사용할 것.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 고객센터 : 080-221-2000(수신자 부담)

작성년월 : 2007. 11

제조발매원

理研

**이연제약주식회사**

본사:서울·용산구 동빙고동 38-6  
 공장:충북 진천군 덕신면 한천리 27-27  
 TEL. (02)793-5557,5374